




비타민 통증치료제

벤포틴

연질캡슐

BENFOTIN Soft Capsule

"Thiamine에 비해 20배의 효과를 지니는 것으로 알려져 있는 Benfotiamine과 염산 피리독신(Vt.B6), 시아노코발라민(Vt.B12)은 신경세포를 건강하게 유지해주어 신경통, 관절통, 근육통 등의 통증을 완화시켜주고 Chondroitin은 관절 및 신경세포, 눈 등, 결합조직(connection tissue)에 영양을 주어 원활한 작용을 하도록 도와주며 γ -oryzanol은 자율신경을 조절하여 평온을 유지해 줍니다."

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,250mg) 중

황산콘드로이틴나트륨(KPC)	200.0mg
벤포티아민(KPC)	50.0mg
피리독신염산염(KP)	50.0mg
시아노코발라민(KP)	0.5mg
감마오리자놀(KPC)	5.0mg

첨가제(동물유래) : 젤라틴(기원 : 소, 사용부위 : 가죽)

첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색1호

[성 상] 연한 분홍색의 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

[효능 · 효과]

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등)
 - 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염의 완화
 - 각기, 눈의 피로

- 다음 경우의 비타민 B₁, B₆의 보급
 - 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후의 체력저하

[용법 · 용량] 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3개월 미만의 영아
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것. (복용전 의사 또는 약사와 상의할 것.)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자, 1세 미만의 영아
- 이상반응
 - 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 구역, 구토, 묽은 변, 설사
 - 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
 - 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 상호작용
 - 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용 투여하지 않는다.
 - 레보도파
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 오 · 남용을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

[포장단위] 자사포장단위

[사용기한] 제조일로부터 24개월

※ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다.

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 재정경제부 고시 소비자 피해보상 규정에 의거, 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자 상담실(☎080-001-0795) 또는 식약청 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr)사이트의 의약품 정보란에서 확인할 수 있습니다.

작성일자 : 2009년 12월 24일

제조회원 :

주비티오 제약
경기도 이천시 부평읍 가산리 491-7

제조원 :

DONGBANG FTL 동방에프티엘(주)
경기도 화성시 향남면 상신리 904-5

판매원 :

제일약품 주식회사
본사: 서울특별시 서초구 반포동 745-5