

혈액순환, 기억력감퇴, 집중력장애 등

징코라센정

Ginkgorasen Tab.

일반의약품

의약품 분류번호	219 기타의 순환계용약
-------------	------------------

징코라센정은 은행잎 추출물을 주성분으로 하는 기질성 뇌기능 장애 치료제로 이명, 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애에 탁월한 효과를 나타냅니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

은행엽엑스(KPC).....120mg

(총 키크고플라본배당체로서 28.8mg)

첨가제(타르색소) : 황색4호, 청색 1호

【성상】

녹색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

- 1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증)의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명
- 3) 이명, 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

【용법·용량】

1. 성인
1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명: 은행엽 엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구투여한다.
2) 기질성 뇌기능 장애: 은행엽 엑스로서 1회 40~80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구 투여한다.
2. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용
드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.
5. 임부에 대한 투여
동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.
6. 소아에 대한 투여
소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.
7. 저장상의 주의사항
직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

【제품문의처】 080-424-7999

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

1. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용할 것.
2. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
3. 포장을 개봉하여 복용시 기밀 정제에 포장물이 따라오는 경우가 있으니 복용시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의할 것

설명서 작성연월일 : 2009. 04. 18.

제조의뢰자

Hanmi 한미약품(주)

경기도 화성시 팔탄면 하저리 893-5

제 조 자 : (주) 씨트리 - 경기도 남양주시 일패동 778-1

판매원

Hanmi 한미메디케어(주)

서울특별시 송파구 방이동 48-9

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월 이후 변경된 내용은 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.