

헤파맥스 골드 연질캡슐

간장질환의 예방 및 보조 치료/ 간 손상 방지, 간 기능 개선



일반의약품
분류번호: 391

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

- 유효성분 : 밀크시슬엑스(생규).....200mg
- 티아민질산염(KP).....4mg
- 피리독신산염(KP).....4mg
- 니코틴산아미드(KP).....12mg
- 판토텐산칼슘(KP).....8mg
- 시아노코발라민(KP).....1.2 μ g
- 기타 첨가제 : 레시틴, 백날, 경화유, 공기름, 젤라틴, 농글리세린, D-소르비톨액70%(비결정성), 에틸바닐린, 적색산화철, 흑색산화철, 카르나우바납, 중쇄트리글리세리드

【성상】

황갈색의 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

※【효능·효과】

다음 질환의 보조치료 : 만성 간질환, 간경변, 독성 간질환

※【용법·용량】

성인 1회 1캡슐, 1일 3회 복용한다.

※【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
 - 3) 이 약에 과민반응 환자
 - 4) 심한 담도 폐쇄 환자
 - 5) 12세 이하 소아
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
레보도파와 병용시 레보도파의 효과를 감소시킬 수 있다.
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성 고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 2) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외 배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부(동물에서의 생식 연구에서 태아에 대한 위험이 나타나지 않았으나 임신 한 여성에 대한 연구는 없다. 모유로 배설 여부는 보고된 바 없다.)
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 이 약의 복용으로 이상반응이 나타나는 경우
 - 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
정해진 용법·용량을 지킬 것.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 (습기가 적고) 서늘한 곳에 (밀전하여(뚜껑을 꼭닫아, 마개로 단단히 막아)) 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호 유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 직접용기에 별도표기

【포장단위】 90캡슐 (10캡슐/PTPX9)

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통해 교환하여 드립니다.
- 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com/ls)나 제품상담 전용전화를 통해 확인할 수 있습니다.
- 본 의품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '온라인의약품도서관([http:// drug.mfds.go.kr](http://drug.mfds.go.kr))'을 참조하십시오.
- 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약물관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

2009.11.11 작성
※ 2018. 1. 21 개정
(Ver.010)
4080309-4



자세한 문의는 제품상담 전용전화를 이용하시기 바랍니다.

제품상담 전용전화(무료) : 080-021-3131