

바이오힐씨[®] 연질캡슐

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

니코틴산아미드(KP).....	20mg
리보플라빈(KP).....	3mg
아스코르브산(KP).....	45mg
티아민염산염(KP).....	2mg
레티놀팔미테이트(KP).....	5,000IU
토코페롤아세테이트(KP) (비타민E로서 5IU).....	5mg
피리독신염산염(KP).....	3mg

【성상】 황갈색의 내용물이 충전된 암적갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

- 1) 다음 경우의 비타민A, B₁, B₂, B₆, C, E의 보급
 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력 저하시, 노년기
- 2) 이약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 눈의 건조감의 완화
 - 야맹증

【용법·용량】 성인 1회 1캡슐, 1일 1회 복용합니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【제조원】 (주)동구제약 경기도 화성시 향남읍 상신리 901-3

【판매원】 종근당 계열회사 경보제약 서울특별시 서대문구
충정로3가 368

제조번호 : 100301

사용기한 : 2013.03.30



1 88 06573 04441 5



종근당

계열회사 Kyongbo Pharm

【사용상의 주의사항】

1. 경고 1) 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 마십시오.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 3개월 미만의 영아
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기가 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 1세 미만의 영아
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 과수산화중환자(hyperoxaluria) : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 4) 임부, 수유부
- 5) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. - 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 설사, 붉은 변, 변비, 위부불쾌감, 발진, 발적
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경 병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 1개월정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조용법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 합니다.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단 될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재되어 있는 지질의 양을 고려 하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 상호작용

- 1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않습니다. - 레보도파

7. 임부에 대한 투여

외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경종 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 마십시오. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품종으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.

8. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 유효기간이 만료된 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

- * 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·반품 받을 수 있습니다.
- * 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 받은 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 작성일(2010년 3월 10일) 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.dongkook.co.kr) 또는 소비자상담실(전화번호 : 030-811-6630) 수신자무담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.