

하루 한 번 종합영양제!

비타데이 정

비타민 A · B · C · D · E · 철분 · 아연 · 셀레늄

일반의약품

분류번호 : 316

【원료약품의 분량】 1정 중

말티닌산테트라올라움(KPC)	11mg
(비타민 A로서 5,500 I.U.)	
에르코칼시페롤(KP)	400 I.U.
(비타민 D로서 400 I.U.)	
제파아스코르빈산(KPC)	125mg
(아스코르빈산으로서 120mg)	
티아민질산염(KP)	3.7mg
리보플라빈(KP)	3.4mg
토코페롤아세테이트50%(KPC)	60mg
(비타민 E로서 30 I.U.)	
파라독신염산염(KP)	3.65mg
나코틴산아미드(KP)	29.76mg
시아노코발라민(KP)	9μg
판토텐산칼슘(KP)	10.87mg
폴산(KP)	400μg
비오틴(USP)	15μg
무수황산동(USP)	5.02mg
(동으로서 2mg)	
황산망간(USP)	15.38mg
(망간으로서 5mg)	
황산아연(KP)	65.97mg
(아연으로서 15mg)	
푸마르산철(KP)	82.14mg
(철로서 27mg)	
염화칼륨(KP)	13.79mg
(칼륨으로서 7.23mg)	
구연산칼륨(USP)	0.62mg
(칼륨으로서 0.224mg)	
요오드화칼륨(KP)	196μg
(칼륨으로서 46μg)	
산화비네올(KP)	165.8mg
(비타민 B12로서 100μg)	
염화코발트(USP)	76.88μg
(코발트로서 15μg)	
몰리브덴산트롬(KPC)	37.83μg
(몰리브덴으로서 15μg)	
셀레늄함유한조효소(KPC)	18.52mg
(셀레늄으로서 10μg)	
작성제 : 식약청인정타르색소(청색1호, 적색40호, 황색203호)	

【성상】 적갈색의 정방형 필름코팅정

【효능·효과】 다음의 경우의 비타민A, B₁, B₂, B₆, C, D, E의 보급

- 육체피로 - 수유기 - 병중, 병후의 체력저하 - 발육기 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 눈의 건조증의 완화, 야맹증 - 뼈 - 이의 발육발달, 구루병의 예방,
- 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료 - 아연의 보급

【용법·용량】 성인 및 12세 이상 어린이 : 1회 1정, 1일 1회 복용하십시오.

【사용상 주의사항】

1. 경고

- 임신부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 않는다(비타민A 결핍증 환자는 제외)
- 6세 이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있습니다.
- 철 함유제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관합니다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락합니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 않습니다.

- 과칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태), 유육종증, 신질환환자
- 이 약 및 이 약에 포함된 성분과 과잉이 있는 환자
- 12개월 미만의 영아
- 과칼슘혈증 환자
- 콜레스테롤
- 혈색소증(철 대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 해모시데린 침착증, 비철결핍성 빈혈
- 중증의 신부전 환자
- 임부

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오.

- 과산화수소혈증(hyperoxaluria: 뇨중에 과량의 수산화이 배설되는 상태)
- 임부, 수유부
- 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자
- 심장, 순환기계기능 환자
- 신장에 환자
- 저단백혈증 환자
- 당뇨관련 질환, 간질환 환자
- 담낭폐쇄, 구리 부족증환자
- 위장관 질환
- 급, 만성 기관지염, 폐부종환자
- 알칼리증, 소화성궤양
- 당뇨병환자

4. 이상반응

- 이 약의 투여에 의해 구역, 구토, 설사, 물은변, 가려움증, 건조하고 거친피부, 통증성 관절부종, 위부 불쾌감, 변비, 발진, 발적, 두드러기, 광선과민증, 복부 위통증, 경련, 열, 혼수, 알레르기 반응, 혈관부종, 관절통, 호산구증가, 요오드중독증, 홍반, 무전속, 중추신경계 기능저하, 요산과다혈증, 과칼슘혈증, 가슴작, 위장통증, 피부염, 락, 호흡기 약화, 탈모, 조급증, 소화장애, 위장관장애, 성욕부통증, 저혈압, 폐부종의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 이 약의 투여에 의해 생리가 예정일보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수도 있습니다. 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 에스트로젠을 포함한 경우 피부염을 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타데이를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 파라독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초 신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 폴산이 부족한 환자에게 비타데이를 1일 10mg이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperursemia: 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 정해진 용법·용량을 지켜십시오.
- 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 이 약에 함유된 비타데이는 정상적인 식사에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000단위 이상을 넘지 않도록 합니다.

6. 상호작용

- 항암도스테로이드, 트리암테렌과 병용 투여시 과칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않습니다.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 레보도파
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

7. 임부, 수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

- 외국에서 임신전 3개월로부터 임신 초기 3개월까지 비타데이를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있었으므로 임신 3개월 이내 또는 임신을 희망하는 부인에는 비타데인A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타데인A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타데인A 투여는 5000IU 미만에서 머물도록 하는 등 적절한 주의가 기울어집니다.
- 비타데인은 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 임신, 수유중 과량 복용시 태아 및 영아의 갑상선 기능장애 및 갑상선증을 유발할 수 있습니다.

8. 임상검사지치의 영향

- 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사지에 영향을 줄 수 있습니다.

9. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 적사일광을 피하고 될 수 있으면 서늘한 곳에 밀봉하여 보관하십시오.
- 오남용을 피하고 품질을 보호유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1-30℃)보관

【포장단위】 100정, 200정

【제조/의뢰지】 (주)동구제약 / 경기도 화성시 향남읍 상리리 901-3

【제조지】 (주)에피가드 / 충북 충주시 주덕읍 당우리 809

【판매원】 (주)종근당 / 서울특별시 서대문구 충정로 3기 360

【작성일】 2009년 4월 20일

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 작성일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

제조업체지

(주)동구제약

제조지

(주)에피가드

판매원



종근당