



진해거담제 코프노캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(377mg) 중
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP) 15.0mg
노스카핀염산염수화물(KP) 20.0mg
트리메토크놀염산염수화물(KP) 2.0mg
구아이페네신(KP) 75.0mg
클로르페니라민말레산염(KP) 2.0mg
첨가제(동물유래) : 유당수화물<기원 : 소, 사용부위 : 우유>

[성상] 미황색 분말이 충전된 상하부 황색의 경질캡슐제

[효능·효과] 기침, 가래, 천식

[용법·용량]
성인 1회 1캡슐씩 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
2) 약으로 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
3) 간장애, 신장애, 갑상선 질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 고열환자, 허약자
4) 심장에 및 고혈압 환자, 고령자
5) 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨장애 환자
6) 의사의 치료를 받고 있는 환자
7) 수유부
3. 이상반응
1) 이 약을 투여하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 식욕부진, 어지러움 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
2) 이 약을 투여하는 동안 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
4. 일반적주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

5. 상호작용
다른 진해 거담제, 감기약, 항히스타민제, 진정제, 알코올 등과 병용 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 자사포장단위

[날알모음포장(PTP)의 제조번호 및 사용기한 보는 법]
예를 들어 "0901 120101"로 표기된 경우, 앞 네자리 "0901"은 제조번호, 뒤 여섯자리 "120101"은 사용기한 "2012년 1월 1일"을 각각 의미함.

※본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※본제품은 재정경제부 고시 소비자 피해보상 규정에 의거, 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
※작성일자 이후 변경된 내용은 소비자 상담실(☎080-001-0795) 또는 식약청 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr)사이트의 의약품 정보란에서 확인할 수 있습니다.

작성일자 : 2009년 08월 17일

제조 및 판매원 :



BioTechnology Original
주비티오제약

경기도 이천시 부발읍 가산리 491-7
소비자 상담실 : 080-001-0795