

로알젤리·알부민함유 고단위 종합영양제

로비텐

연질
캡슐

● 육체피로, 임신·수유기 ● 병중·병후의 체력저하시 ● 말초혈행장애 및 강년기시 ● 어깨·목결림, 수족냉증

【원료약품 및 분량】 1캡슐(1,550mg) 중

로알젤리 (KPC)	20mg
토코페콜아세테이트 (KP)	45mg
아스코르브산 (KP)	100mg
티아민염산염 (KP)	5mg
리보플라빈 (KP)	2mg
파리독신염산염 (KP)	5mg
시아노코발린 (KP)	12μg
니코틴산아미드 (KP)	40mg
타르색소)식약청인정타르색소	
동물유래성분 : 건조난백분말	

【성 상】 황갈색의 유상물이 든 양면 적갈색의 연질캡슐제

【효능·효과】 이약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 말초혈행장애 및 강년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증
- 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, E의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기.

【용법·용량】 1일 1~3회 1회 1캡슐씩 복용

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 제조일로부터 36개월

【사용상의 주의사항】

1. 경고-로알젤리가 함유된 제제 사용으로 인하여 천식 및 심각한 알레르기 증상 등의 부작용을 나타냈다는 외국의 보고가 있으므로 천식 및 알레르기 환자는 복용하지 말 것.
2. 다음 환자에게 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것.)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과산화노증환자(hyperoxaluria : 뇨 중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임신, 수유부
4. 부작용
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 위부 불쾌감, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 설사, 땀의 변 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지 하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
 - 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 5) 파리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
 - 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
 - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
5. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 3) 복용 시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용한다.
6. 상호작용 이 약을 투여할 경우에는 레보도파 함유 약물과 병용 투여하지 않는다.
7. 임상검사치에의 영향
 - 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사치에 영향을 줄 수 있다.
8. 저장시의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 작성일자(2010년 1월) 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kda.go.kr/kda2>)에서 확인하 실 수 있습니다.
- 소비자상담실: 043-881-6333

작성일 : 2010. 01. 01

제조외사



충북 음성군 금왕읍 도청리 33-32
한솔 신약(주)

제조사

(주)동구제약
경기도 화성시 향남읍 상신리 901-3

판매자



한미메디케어(주)
서울시 송파구 방이동 48-9