

속콜크린

**연질
캡슐**

효과빠른 액상형 종합 감기약

코물·코막힘·재채기
인후통·기침
오한·발열
두통·관절통·근육통
[성분·함량] 이 약 1캡슐 중

클로르페니라민말레산염(KP)	1.25mg
아세트아미노펜(KP)	150.0mg
카페인무수물(KP)	8.33mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	10.0mg
첨가제(타르색소) : 황색203호, 황색5호, 청색1호	

[성상] 백색의 이상 내용물을 함유한 녹색의 타원형 연질캡슐

[효능·효과] 감기의 증상(코물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량]

- 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐을 식후 30분에 복용하십시오.
- 어린이(8세~14세) : 1일 3회, 1회 1캡슐을 식후 30분에 복용하십시오.



본 제품은 어린이 보호용 안전포장을 사용하고 있습니다.
복용시,

- 가위 등으로 절취선을 따라 자르십시오.
- 접착이 안된 화살표부분을 잡고 화살표 방향으로 떼어낸 후 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열 진통제를 복용해야 하는 경우 의사 또는 약사와 상의하여야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상 및 위장 출혈이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 사람은 복용하지 마십시오.

- 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
- 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
- MAO 저해제를 투여 중이거나 투여를 중지한 지 2주 이내인 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 동시에 복용하지 마십시오.

- 진해거담제, 다른감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
- 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람
- 심장에 장애가 있는 사람, 또는 고령자
- 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나는 경우
- 2) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

7. 이 약을 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 장기 연용하지 마십시오.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임 하에 복용시키십시오.
- 4) 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 자사포장단위

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염 되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자분쟁해결기준”에 의거 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 설명서 최종 개정연월일(2009년 5월 26일)이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

설명서 개정년월일 : 2009. 05. 26
P0907-01

제조회사 :



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4
소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

제조사 :



알앤피코리아(주)

경기도 화성시 향남읍 상신리 906-6