

메가코인플러스⁺

연질캡슐



[원료약품 및 그분량] 1캡슐 중

황산콘드로이틴나트륨(KPC)	300mg
감마오리지놀(KPC)	5mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg
니코틴아미드(KP)	10mg
시아노코발라민(KP)	30μg
토코페롤아세테이트(KP)	50mg
판토텐산칼슘(KP)	10mg
푸르실티아민(KPC)	25mg
피리독신염산염(KP)	15mg

첨가제(타르색소)(KPTaCS): 적색40호, 황색5호, 청색1호
 동물유래성분(젤라틴): 건강한 소의 가죽 안쪽 부위에서 유래된 Hide를 사용

[성상]

황색의 내용물이 충진된 초콜렛색의 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민(E, B₁, B₂, B₆)의 보급 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력 저하시, 노년기
 2. 이 약에 함유된 비타민등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 1) 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 - 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증
- 2) 다음 증상의 완화 - 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등), 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염
- 3) 각기 4) 눈의 피로

[용법·용량]

성인 및 8세 이상의 어린이: 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 3개월 미만의 영아
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. (복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부, 수유부
- 3) 고지민백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 부작용

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것. : 위부 불편감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 구내염, 식욕 부진, 복부 팽만감 2) 이 약의 투여에 의하여 생리기에정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다. 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다. 5) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다. 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia: 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지질의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정중용 지질제물 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 상호 작용

이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용 투여하지 않는다. 1) 레보도파

6. 임상검사치에의 영향

이를 황색으로 변화시켜 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장 방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[포장단위] 60캡슐, 120캡슐

[사용기간] 제조일로부터 36개월

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 따라, 상당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 이 사이트(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 소비자 상담실(반문 및 교환처): 080-010-1114

개정연월: 2010. 08

판매원:

www.ekdp.com

광동제약주식회사

경기도 평택시 모곡동 440-2

제조사:

동방에프티엘(주)

경기 화성시 함남면 성산리 904-5