

고함량 간 기능 개선제

헤파두스 플러스⁺ 연질캡슐

(밀크시슬엑스 350 mg)

HEPADUS PLUS Soft Caps.

일반의약품 분류번호 : 391

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

밀크시슬엑스(생규).....350 mg(실리마린으로서 196 mg)

첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호

【효능 및 효과】 다음질환의 보조치료 : 독성간질환, 만성간염, 간경변

【용법 및 용량】 1일 1회, 1회 1캡슐

【성상】 황갈색의 유상 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 임신, 수유부 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방 대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 드물게 위통 또는 설사 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것. 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기 복용시에는 의사 또는 약사와 상의할 것. 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것. 3) 의약품을 원래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 꼭 담아 보관할 것.

【포장단위】 60캡슐, 120캡슐

【제조의뢰자】 조아제약(주) 경상남도 함안군 함안면 광정로 318

인터넷홈페이지 <http://www.choa.co.kr>

【제조사】 (주)알피코프 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【수신자부담고객상담실】 080-988-8889

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.

※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 전달하십시오.

문안작성일 : 2013. 10. 07 (Rev.0)