

(이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 제품과 함께 보관하십시오)

간에 이상이 생기면 나타나는 증상

- 전신권태로 쉽게 피로감을 느끼며 회복이 잘 안됩니다
- 음주 후 해독이 안되고 숙취가 오래갑니다
- 양치질 할 때 헛구역질이 나며 속이 메스꺼웁니다
- 헛배가 부르고 속이 거북하며 소화가 잘 안됩니다
- 눈에 피로가 자주 오며 황달증상이 있습니다
- 소변이 탁해지고 냄새가 심합니다
- 변비, 설사가 교대로 자주 일어납니다
- 얼굴에 윤기가 없고 기미, 주근깨가 생기며 기려움증을 느낍니다

원료약품 및 그분량 : 1캡슐 중

카르두스마리아누스엑스(자사기준).....	200.00mg
티아민질산염(KP).....	4.00mg
피리독신염산염(KP).....	4.00mg
니코틴산아미드(KP).....	12.00mg
판토텐산칼슘(KP).....	8.00mg
시아노코발라민(KP).....	0.0012mg

첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색5호, 적색40호

상상 : 황갈색의 유상내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

효능·효과 : 다음 질환의 치료보조 : 만성간질환, 지방간, 간경변, 중독성 간장질환

용법·용량 : 성인 1회 1캡슐을 1일 3회 복용한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여 해야 하는 환자

3. 복용시 다음 사항에 주의할 것.

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
- 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.

4. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의할 것.

- 1) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의 할 것.
- 2) 1개월정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

5. 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에는 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면(습기가 적고) 서늘한 곳에(밀전하에) 보관할 것.
- 3) 오용을 피하고, 품질을 보호 유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 말 것.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

사용기간 : 제조일로부터 24개월

포장단위 : 자사포장단위

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 받은 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kdd.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품 정보」를 참조하시거나 02-564-2722로 문의하여 주십시오

※ 의약품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주시고

작성년월일 : 2011. 07. 15