

다이제틴 정

【성분·함량】1정 중

- 유효성분 : 디아스타제·프로테아제·셀룰라제(전분당화력(pH4.5) 278단위이상, 전분호정화력(pH4.5) 640단위이상, 단백소화력(pH3.0) 170단위이상, 섬유소당화력(pH4.5) 2단위이상)(KP) 20mg
- 리파제(지방소화력(pH6.0) 120단위)(KP) 20mg
- 우르소데옥시콜산(KP) 10mg
- 시메티콘파우더(시메티콘으로서 30mg)(별규) 46.15mg
- 첨가제(타르색소) : 황색4호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크, 청색2호 알루미늄레이크
- 기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카멜로오스나트륨, 탭탈드녹색(11G544), 포비돈

【성상】녹색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체할, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】

성인 1회 1~2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
 - 2) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
2. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
3. 소아에 대한 투여
 - 1) 이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않는다.
4. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】300정

【저장방법 및 사용기간】기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【학술정보문의】080-585-0004

- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 - 본 제품은 우수 의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
 - 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
 - 의약품 용어설명, 의약품 정보, 첨부문서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

작성연월일: 2020. 09. 28
13/202009

【제조의약품】

Arlico
알리코제약(주)
충북 진천군 공해원면 용소2길 21

【제 조 자】

BAS (주)바스칸바이오제약
BAS-KHAN BIO Pharma Inc.
경기도 안성시 원곡면 원당로 354