

일반의약품

분류번호 315
(비타민 E 및 K제)

체인즈미 연질캡슐

항산화제가 포함된 혈액순환개선제

체인즈미 연질캡슐은 혈관의 건강을 지켜주는 비타민E, 비타민C를 함유하여 손발저림, 수족 냉증(손발이 차가움), 어깨·목결림 증상을 개선하는 영양제입니다. 강력한 항산화제인 코엔자임Q10과 항산화비타민을 함유하여 체내 세포를 손상시키는 활성 산소를 제거하며, 에너지 대사 개선을 통해 피로를 해소하고, 심혈관 질환의 위험인자인 호모시스테인을 낮춰주어 건강을 유지하는데 도움을 드립니다.

원료약품의 분량 (1캡슐 중)

유비데카레논(코엔자임큐텐) (KP)	5.0mg
토코페롤아세테이트(비타민E) (KP)	200.0mg
아스코르브산(비타민C) (KP)	500.0mg
γ -오리자놀(KPC)	5.0mg
셀레늄함유건조효모(KPC) (셀레늄으로서 25 μ g)	46.3mg
피리독신염산염(비타민B ₆) (KP)	12.0mg
폴산(엽산, 비타민B ₉) (KP)	0.25mg
시아노코발라민100배산(비타민B ₁₂) (별규) (시아노코발라민으로서 15 μ g)	1.5mg
산화아연(KP) (아연으로서 15mg)	18.7mg
첨가제(부형제) : 월견초종자유(별규)	200.0mg
캡슐기제(타르색소) : 청색1호, 적색40호, 황색5호	

성상 : 이 약은 황갈색의 내용물을 함유하는 일면 적색, 일면 갈색의 장방형 연질캡슐제입니다.

체인즈미

효능·효과

1) 다음 경우의 비타민 E, B₆, C의 보급 :

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 비타민E : 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 비타민C : 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸 출혈·비출혈(코피) 예방

2) 아연의 보급

용법·용량 : 만12세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 2회 복용합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용(먹는) 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

※ 5030494-1130607

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 궤양염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게는 신중히 투여합니다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부 통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 과량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 8) 할랄도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 9) 우발적으로 과량복용한 경우
- 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 11) 이 약은 월경초종자유를 함유하고 있으므로 발진 등의 알레르기 반응과 복통이 나타날 수 있습니다.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈지지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

주의

1. 온도가 높은 곳에 보관시 캡슐이 변형될 수 있으므로 서늘한 곳에 보관하십시오.
2. 포장을 개봉하여 복용시 가끔 제품에 포장물(알루미늄 호일지)이 같이 따라오는 경우가 있으므로 복용시 캡슐에 포장물이 부착되어 있는지 확인하고 캡슐만 복용하십시오.
3. 제품 개봉 또는 취급시에 포장재(알루미늄 호일지)로 인하여 상처를 입을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
4. 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오. 습기, 열, 빛은 약의 효과와 안전성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의바랍니다.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 60, 120캡슐

○ 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
○ 이 설명서는 2013년 6월 7일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

제조사 :

(주)서흥캡셀

충청북도 청원군 오송읍 오송생명로 61

제조의뢰자 :

일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우로 27길 2

공장 : 경기도 안성시 궁단로 25

소비자상담실 : (전화)080-022-1010(수신자부담)

※ 5030494-1130607