

영빅스 캡슐

분류번호:119

【원료약품 및 그 분량】: 이 약 1캡슐 중

오로트산시프로헵타딘(KPC) 1.5mg

L-리신염산염(KP) 150mg

DL-염산카르니틴(KPC) 150mg

코바마미드(KPC) 1mg

스테아르산마그네슘

【성상】

분홍색 분말이 들어있는 상하부 적색의 경질캡슐제

【효능, 효과】 식욕부진, 성장부진

【용법, 용량】

- 성인 1회 1캡슐 1일 2회 8일간 식전에 복용하고
이후부터는 1회 2캡슐 1일 2회 복용합니다.- 7-12세 : 1일 1회 1캡슐을 8일간 저녁 식전에
복용하고 이후부터는 1회 1캡슐 1일 2회 복용합니다.- 3-6세 : 1일 1회 1/2캡슐을 8일간 저녁 식전에
복용하고 이후부터는 1회 1/2캡슐 1일 2회 복용합니다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※약사, 의사의 지시에 따라 사용하십시오.

※만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패
또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상을
통하여 교환하여 드립니다.※이 문서 최초 일자(2009년 7월 10일)이후 변경된
내용은 홈페이지나 소비자상담실에서 확인할 수
있습니다.

소비자 상담실 : 080-990-8200

홈페이지 : www.yungjin.co.kr

제조 판매원 : 영진약품공업(주)

공장 : 경기도 화성시 무송동 470-5

문서최초일 : 2009년 7월10일

영빅스 캡슐

식욕증진효과

영양소의 흡수대사촉진

필수아미노산함유

시프로헵타딘성분의
필수아미노산을 함유한
식욕촉진제생명을 위한 의학
영진약품

【사용상 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말아주십시오.

- 1) 녹내장 환자
- 2) 이 약의 성분에 과민증 환자
- 3) 요저류(소변고임)의 소인이 있는 환자
- 4) 노령자(노인) 및 쇠약 환자
- 5) 신생아

2. 이상반응

- 1) 과민성 환자에서는 졸음이 나타날 수 있습니다.
- 2) 드물게 두통, 구역, 구갈이 나타날 수 있습니다.

3. 상호작용

MAO저해제(억제제) 및 기타 중추신경억제제와
병용(함께복용) 투여하지 않습니다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 뭉 수 있으면 습기가 적고
서늘한 곳에 밀전하여 보관하여 주십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에
보관하는 것은 의약품오용(잘못사용)에 의한
사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이
될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아
보관하여 주십시오.



8 806424 021315

영빅스 캡슐

식욕증진효과

영양소의 흡수대사촉진

필수아미노산함유

시프로헵타딘성분의
필수아미노산을 함유한
식욕촉진제생명을 위한 의학
영진약품