

말초혈행장애 및 갱년기

베타파워셀

연질캡슐

[성분·함량] 1캡슐 중

셀레늄 함유 건조효소(셀레늄으로서 50μg)(KP).....	92.6mg
β-카로틴 함유 건조효소(베타카로틴으로서 1.5mg)(KP).....	50.0mg
아스코르브산(KP).....	500.0mg
토코페롤 아세테이트(비타민 E로서 400 IU)(KP).....	400.0mg
리보플라빈(KP).....	10.0mg
피리독신 염산염(KP).....	7.3mg
시아노코발라민(KP).....	1.8μg
니코틴산 아미드(KP).....	20.0mg
티아민 질산염(KP).....	12.34mg

첨가제(KPTaCS): 청색 1호, 적색 40호, 황색 203호
 첨가제(동물유래성분): 젤라틴(소, 가축), 숙신산 젤라틴(소, 가축)
 첨가제(식물유래성분): 대두유(콩기름)

[성상] 적갈색의 내용물이 들어있는 알갈색의 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₆, 의 보급

- 비타민 A, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급
- 육체피로 · 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 · 노년기
- 햇빛 · 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
- 잇몸출혈 · 비출혈(코피) 예방
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨 · 목결림, 수족저림
- 수족냉증(손발이 차가움)

[용법·용량] 성인 1일 1회 1캡슐을 식후에 복용한다.

[사용상주의사항]

1. 경고
 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신한 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000IU/일 이상 투여하지 않는다.(비타민 A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과 과민증이 있는 환자
- 2) 12개월 미만의 영아(갓난아기, 젖먹이)
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 과산화노증환자(hyperoxaluria : 노증에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부, 수유부
- 4) 심장, 순환계 기능 장애 환자
- 5) 신장에(신장장애) 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 위장관 질환
- 8) 고지단백혈증, 당뇨병성 고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 부작용

- 1) 이 약 투여에 의하여 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 복부(배부분)팽만감, 위부불쾌감, 피부염, 땀, 호흡기 막힘, 탈모, 조급증, 식욕부진, 묽은 변, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment 신체에 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5000IU 이상을 넘지 않도록 한다.
- 4) 지방과 부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리아멘테놀과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용(사용))투여하지 않는다.
 가) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 나) 레보도파
- 3) 녹차, 홍차, 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용 전후에는 피할 것

7. 임부, 수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경증 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보충을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000IU/일 미만으로 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

8. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용) · 남용을 피하고, 품질을 보호, 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 자사포장단위

[판매원] **종근당** 본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 8(충정로 3가)
 공장 : 충남 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48

[제조자] 한국프라임제약(주) / 전북 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

[소비자상담실] 080-6776-080

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 식약처온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.