

※ 의약품 사용하시기 전에 주의깊게 읽도록하시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
 ※ 의약품을 처방된 증상·환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

항혈소판약 **메스트린정 200mg**

(인도부펜)

전문의약품
 분류번호:기타의 혈액 및 체액용약(03390)

【원료약품의 분량】 1정 중

인도부펜(KPC) 200 mg

【성 상】

양면이 볼록한 흰색의 장방형 정제

【효능·효과】

1. 다음과 같은 질환에 수반되는 혈전의 치료
 : 허혈성 뇌혈관질환, 허혈성 심질환, 죽상
 경화성 말초혈관질환, 정맥혈전증
2. 체외순환(혈액투석)시 혈전생성 예방

【용법·용량】

- 인도부펜으로서 보통 1일 200mg~400mg
 을 2회로 나누어 식후 경구투여한다. 1일
 200mg은 장기치료를 요하는 경우의 투여
 용량이다.
- 고령자 : 의사는 투여시 환자의 연령증가에
 따라 신기능도 점차 손실됨을 고려하여 용
 량설정에 주의해야 하며, 필요할 경우 용량
 을 감소하여야 한다. 65세 이상 고령자의
 1일 권장량은 이 약으로서 100mg ~ 200
 mg이다.
- 체외순환(혈액투석)시 혈전생성을 방지하기
 위한 용량은 환자의 상태에 따라 설정 되어
 야 한다. 의사의 신중한 판단에 따라서 매
 투석전에 이 약으로서 100mg이 경구투여
 될 수 있다.
- 신기능이 저하된 환자에게는 신부전 정도에
 따라서 용량을 감소시켜야 한다.
 다음과 같은 용량표를 참고한다.

크레아티닌 청소율	인도부펜 투여량
분당 80mL <	1회 100~200mg을 1일 2회
분당 40~80mL	1회 100mg을 1일 1~2회
분당 40mL >	100mg을 격일 또는 매일

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 1) 선천성 또는 후천성 출혈성 질환 환자
 2) 궤양 또는 위장관계 병변 환자
 3) 이 약 또는 동일약품군의 다른 약에 대
 해 과민반응 환자
 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈
 락토스 불내성(galactose intolerance),

Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lac-
 tase deficiency) 또는 포도당-갈락토
 오스 흡수장애(glucose-galactose
 malabsorption) 등의 유전적인 문제가
 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 1) 위장관 병변의 병력이 있는 환자
 2) 다른 항응고제 또는 비스테로이드소염
 제를 투여받고 있는 환자
3. 이상반응
 1) 위부불쾌감, 복부팽만, 변비 등 위장관
 계 장애가 발생하면 용량을 줄이거나 투
 여를 중지하는 것이 바람직하다.
 2) 피부알레르기 반응이 나타날 경우 투여
 를 중단한다.
 3) 잇몸출혈, 비출혈, 드물게 혈변을 수반
 한 위장관출혈, 소화성궤양과 혈뇨가 보
 고되었다.
4. 일반적 주의
 경구용 저혈당제를 복용하는 당뇨병 환자
 는 자주 혈당을 측정하는 것이 바람직하다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
 동물실험에서 태자에 대한 독성을 나타내
 지 않았지만, 임부 또는 임신하고 있을 가
 능성이 있는 여성 및 수유부에게는 사용하
 지 않는 것이 바람직하다.

【저 장 방 법】

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포 장 단 위】 자사포장단위

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
 만약 구입 시 사용기한(유효기한)이 경과되었
 거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될
 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립
 니다.

※ 이 첨부문서 작성일자이후 변경된 내용은
www.chodang.com 또는 전화 : 02-869-01
 81에서 확인 할 수 있음.

※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또
 는 식품의약품안전청으로 연락하시고 의약품
 용어설명 및 정보는 "이지드러그(ezdrug.kfda.
 go.kr) 의약품 정보 참조"

제조 발매원

초당약품공업주식회사

경기도 안산시 단원구 록내동 487번지

문서작성년월일 : 2010.02.24

