

# 임산부 종합영양제 프리비정

일반의약품

| 의약품<br>분류번호 | 386                        |
|-------------|----------------------------|
|             | 종합비타민제<br>(비타민 A D 종합제) 제1 |

## 【원료약품의 분량】 1정 중

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 폴산(KP)                        | 0.5mg    |
| 타이민산염(KP)                     | 1.6mg    |
| 리보플라빈(KP)                     | 1.8mg    |
| 니코틴산아미드(KP)                   | 19mg     |
| 피리독신염산염(KP)                   | 2.6mg    |
| 아스코르브산(KP)                    | 100mg    |
| 비오틴(USP)                      | 0.2mg    |
| 0.1% 시아노코발라민(KPC)             | 4mg      |
| (시아노코발라민으로서 4μg)              |          |
| 판토텐산칼슘(KP)                    | 10mg     |
| 초산토코페롤 50%(KPC)               | 30mg     |
| (비타민으로서 15IU)                 |          |
| 무수인산수소칼슘(KP)                  | 336.62mg |
| (인으로서 76.63mg, 칼슘으로서 99.16mg) |          |
| 황산망간(USP)                     | 2.31mg   |
| (망간으로서 0.75mg)                |          |
| 황산아연(USP)                     | 11.4mg   |
| (아연으로서 4.15mg)                |          |
| 셀레늄함유건조효모(KPC)                | 13.89mg  |
| (셀레늄으로서 7.5μg)                |          |
| 폴리설파카리드철착염(KPC)               | 63.05mg  |
| (철로서 29mg)                    |          |

## 【성 상】

미황색의 정방향 필름코팅정제

## 【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>, C, E의 보급  
육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기
- 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

## 【용법·용량】

12세 이상 및 성인 1일 1회 1정 복용

## 【사용상 주의사항】

### 1. 경고

- 6세 이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있다.

### 2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 과칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자
- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 12개월 미만의 영아(갓난아기)(미네랄 함유제제)
- 혈색소중(철대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 신경성 환자
- 중증의 신부전 환자

### 3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1세 미만의 영아(갓난아기)
- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 햇빛을 많이 보고 장상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민 D 또는 칼슘의 투여를 피한다
- 과산화수소혈증(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 임부, 수유부
- 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자
- 심장순환기계기능 장애 환자
- 신장매(신장장애) 환자
- 신장백혈증 환자
- 감염배당체를 투여 중인 환자
- 담낭관련 질환, 간질환 환자
- 위장관 질환

### 4. 부작용

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.  
- 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 구역질, 피부발진, 두드러기, 가려움증, 광선과민증, 복부(배부) - 위통증, 경련, 열, 혼수, 피부염, 땀·호흡기 악취, 탈모, 조급증, 위장장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종(부기)
- 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 정정 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 예스트로겐을 포함한 경구용(약) 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전 증의 위험이 증가될 수 있다.
- 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있다.
- 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 유허성신부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

### 5. 일반적주의

- 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

#### 6. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 사용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
  - 가) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
  - 나) 레보도파
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

#### 7. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

#### 8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오용(잘못사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

#### 【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

#### 【포장단위】

자사포장단위

#### 【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

#### ※ 주의

1. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용할 것.
2. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
3. 포장물 개봉하여 복용 시 가품 정제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 작성연월일 : 2010. 03. 05

제조의뢰자 : **Hanmi** 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 방이동 45

(공장)경기도 화성시 팔탄면 하저리 893-5

제조사 : 한국콜마(주)-충남 연기군 전의면 신정리 618-3

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는  
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 발행된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

8 801121 009357

00935001