

말초혈행장애 및 갱년기 증상의 완화 -

셀레트론

연질캡슐

[성분·함량] 1캡슐 중

셀레놀함유간조호모(셀레늄으로서 50μg) (KPC)	92.6mg
β-카로틴 30% 현탁액(베타카로틴으로서 15mg) (KPC)	50mg
아스코르브산 (K)	500mg
토코페롤아세테이트(비타민E로서) (K)	400IU

첨가제(식약청인정 타르색소): 적색40호, 청색1호, 황색5호, 황색203호
젤라틴, 호박산젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 가죽)

[성상] 적색 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연질캡슐제

[효능·효과]

- 다음경우의 비타민 A, C, E의 보급
- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상)
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화:
 - 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 해빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
 - 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방

[용법·용량] 성인 1일 1회 1캡슐을 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000IU이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000IU/일 이상 투여하지 않는다(비타민 A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 만 1세 미만의 영아(갓난아기)
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 과산화노증환자(hyperoxaluria: 노중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 4) 임부, 수유부
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장에(신장장애) 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 위장관(장) 질환
- 9) 고지단백혈증, 당노병성고지질혈증 및 체장(이장)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질생 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 10) 이 약은 황색5호(선택셀로론 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 이상반응

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기)
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)
 - 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조경증
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 예스트로겐을 포함한 경우 임신증세를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈 막힘)증의

위험이 증가될 수 있다.

- 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 다량투여로 인해 구역·구토 등의 위장증상, 고트롬혈증, 울혈성신부전 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU이상을 넘지 않도록 한다.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정중추 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 상호작용

- 1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용(사용))투여하지 않는다.
 - 인신약, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에 피할 것

7. 임부·수유부에 대한 투여

외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품동으로부터의 섭취량에 주의를 하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

8. 임상검사치에의 영향

각종 요검시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 (뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오염(잘못 사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 45캡슐, 90캡슐

- ※ 의약품의 사용하기 전에 첨부문서를 주의감에 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 우수약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중에 변질 또는 파손되거나 사용기한이 경과된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kida.go.kr>) → 정보마당 → 의약품등 정보를 참조하세요.
- ※ 본 제품 첨부서에 작성(개정) 2011년 11월 8일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.arlico.co.kr)의 제품정보 또는 제품 문의처 전화(080-585-0004)를 통해 확인할 수 있습니다.

[제조외의사]  **Arlico** 승백 천전로 광혜면 회죽리 160-17
알리코제약(주) www.arlico.co.kr

[제조자] (주)동구제약 경기도 화성시 향남읍 상신리 901-3
www.dongguk.co.kr

[판매자]  **보령제약** 경기도 안산시 단원구 신검동 112-3
www.boryung.co.kr