

활성형 종합비타민제 조아민정

[원료약품 및 그 분량] 1정(587mg) 중

푸르셀티아민(KPC)	50mg
리보플라빈부티레이트(KP)	2.5mg
피리독살포스페이트수화물(KPC)	2.5mg
히드록소코발라민아세트산염(KP)	5.22 μ g
(히드록소코발라민으로서 5.0 μ g)	
아스코르브산(KP)	70mg
토코페롤아세테이트50%(KPC)	40mg
(초산토코페롤로서 20mg)	
첨가제(동물유래) : 유당수화물 <기원:소, 사용부위:우유>	
첨가제(타르색소) : 적색40호	

[성상] 적갈색의 타원형 필름코팅정제

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, E의 보급
 - 육체피로, 병중·병후의 체력 저하시, 임신·수유기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨결림) 등)
- 각기
- 눈의 피로

[용법·용량]

보통 성인 1회 1정씩, 1일 1~2회 식후 복용

[사용상 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자.
 - 2) 3개월 미만의 영아
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것. (복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 1) 1세 미만의 영아
 - 2) 의사의 치료를 받고있는 환자
 - 3) 과수산노증환자 (hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 4) 임부, 수유부

3. 이상반응

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μ g이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 상호작용

- 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여하지 않는다.
- 레보도파

6. 임상 검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.
- 3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 자사포장단위

[날알모음포장(PTP)의 제조번호 사용기한 보는 법]

예를 들어 "1001 130101"포 표기된 경우, 앞 네자리 "1001"은 제조번호, 뒤 여섯자리 "130101"은 사용기한 "2013년 1월1일"을 각각 의미함.

※ 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 재정경제부 고시 소비자 피해보상 규정에 의거, 구입하신 약국에서 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(☎080-001-0795) 또는 식약청 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr)사이트의 의약품 정보란에서 확인할 수 있습니다.

작성일자 : 2010년 06월 02일

제조 및 판매원 :



BioTechnology Origination
주비티오 제약

경기도 이천시 무밭읍 가산리 491-7