

고단위 활성비타민 + 미네랄양산화제 함유 종합영양제

# 베어파워 정



## 【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(1,044.17mg) 중

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 푸르셀티아민염산염(KP) .....                     | 27.285mg |
| 아스코르브산과립97%(아스코르브산으로서 600mg) (별규) ..... | 618.56mg |
| 리보플라빈부티레이트(KP) .....                    | 5.0mg    |
| 파리독신염산염(KP) .....                       | 5.0mg    |
| 0.1%시아노코발라민(시아노코발라민으로서 6μg) (KPC) ..... | 6.0mg    |
| 폴산(KP) .....                            | 0.25mg   |
| 비오틴(USP) .....                          | 22.5μg   |
| 니코틴산아미드(KP) .....                       | 50.0mg   |
| 판토텐산 칼슘(KP) .....                       | 20.0mg   |
| 초산토코페롤50%(토코페롤아세테이트로서 20IU)(KPC) .....  | 40.0mg   |
| 푸마르산철(철로서 4.4mg) (USP) .....            | 13.5mg   |
| 산화아연(아연으로서 7.5mg) (KP) .....            | 9.33mg   |
| 셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서 25μg) (KPC) .....      | 46.3mg   |
| 동물유래성분(유당수화물/소/우유)                      |          |

## 【성 상】 노란색의 타원형 필름코팅정

## 【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>, C, E의 보급  
: 육체피로, 임신, 수유기, 병중, 병후의 체력 저하시, 노년기
2. 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등)
3. 각기, 눈의 피로
4. 햇빛, 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
5. 잇몸 출혈, 비출혈 예방
6. 아연의 보급

## 【용법·용량】 12세 이상 어린이 및 성인: 1회 2정을 1일 1회 복용 또는 1회 1정씩 1일 2회 복용합니다.

## 【사용상의 주의사항】

1. 경고
  - 1) 6세 이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있다.
  - 2) 철 함유 제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
  - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
  - 2) 12개월 미만의 영아
  - 3) 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
  - 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)
  - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 2) 과산화노증환자(hyperoxaluria: 뇨 중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
  - 3) 임부, 수유부
  - 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자
  - 5) 심장·순환기계 기능 장애 환자
  - 6) 신장애 환자
  - 7) 저단백혈증 환자
  - 8) 위장관 질환

#### 4. 이상반응

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
  - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 구내염, 식욕부진, 복부팽만감, 두드러기, 가려움증, 광선과민증, 복부·위통증, 경련, 열, 혼수, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종, 저혈압
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민드를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.

#### 5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

#### 6. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제, 레보도파와 병용 투여하지 않는다.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것

#### 7. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

#### 8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60, 120정

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【소비자상담실】 043-881-6333

【제조회사】



**한 솔 신 약 (주)**

충북 음성군 금왕읍 도청리 33-32

【제조사】



**주식회사 대웅제약**

경기도 화성시 향남읍 상신리 906-10

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 작성일자(2010년 5월) 이후 변경된 내용은 이지드러그(<http://ezdrug.kida.go.kr/kida2>)에서 확인하실 수 있습니다.