

알부로제

연질
캡슐

의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

중년기가 되면 혈액순환이 잘 되지 않아 수족 냉증(손발이 차가움), 수족 저림 등의 증상이 나타나기 쉬우며 갱년기로 인한 어깨결림, 두통, 두증, 불면의 증상도 출현하기 쉽습니다. 알부로제 연질캡슐은 로알젤리, 비타민B군, 비타민C, 비타민E가 이상적으로 배합되어 갱년기장애, 말초혈행장애로 인한 수족장애(손발이 차가움), 수족저림의 개선 효과가 우수하며 육체피로나 임신·수유기 영양보급에도 좋습니다.

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1캡슐 중

로알젤리(KPC).....	20mg
(10-히드록시-2-데케노인산으로서 0.8mg)	
토코페롤아세테이트(약전).....	45mg
(비타민E로서 45I.U.)	
아스코르브산(약전).....	100mg
티아민염산염(약전).....	5mg
리보플라빈(약전).....	2mg
피리독신염산염(약전).....	5mg
시아노코발라민(약전).....	12μg
니코틴산아미드(약전).....	40mg
첨가제(동물유래) : 건조난백분말(별규).....	200mg
첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색5호, 적색40호, 황색203호(KPTaCS).....	적량

[성 성] 황갈색의 유상물이 든 양면 적갈색의 연질캡슐제

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, E의 보급
- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후의 체력저하시 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
· 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)

[용법·용량] 1일 1~3회 1회 1캡슐씩 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에게 투여하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 (복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 1세 미만의 영아(갓난 아기)
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 과수산노증환자 (hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 4) 임부, 수유부
- 5) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 부작용

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은변, 식욕부진, 복부(배부)팽만감
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용(먹는) 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상 (neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상 (glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증 (hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 복용시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용한다.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 경구용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 상호작용

- 1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여하지 않는다. - 레보도파

6. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오(잘못사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[포 장 단 위] 자사포장단위

[저 장 방 법] 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국 개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상에 드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 첨부문서 최종 개정년월일(2010.05.07)이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.

작성년월일 : 2010.05.07

제조외리자

 **일양바이오팜**

충북 제천시 왕암동933,933-1
소비자상담전화번호 080-570-3700
홈페이지 www.ilyangbiopharm.co.kr

제조사 : (주)동구제약 / 경기도 화성시 함평읍 상신리 901-3

P1005-00