

본알렉스 함유 고단위 종합영양제

로알팩스

연질캡슐

일반의약품

※ 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 항상 본 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품 및 분량】 1캡슐 중

로알팩스(KPC)	20mg
(10-히도록시-2-데케노인산으로서 0.8mg)	
토코페롤아세테이트(KP)	40mg
(비타민E로서 40IU)	
아스코르브산(KP)	100mg
티아민염산염(KP)	10mg
라보플라빈(KP)	2mg
파리독신염산염(KP)	5mg
시아노코발라민(KP)	0.012mg
니코틴산아미드(KP)	40mg
정가제(부형제) : 건조난분말(별구)	200mg외
정가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색203호, 황색5호	
동물유래성분 : 건조난분말(계란, 난백)	

【성 성】 황갈색의 유상물이 든 양면 적갈색의 연질캡슐제

【용법·용량】 성인 및 8세이상 어린이 : 1일 3회, 1회 1캡슐씩 복용합니다.

【효능·효과】 다음 경우의 비타민B₁, B₂, B₆, C, E의 보충

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목걸림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨통증) 등)
- 각기
- 눈의 피로

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에게 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 과수산노증환자 (hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부, 수유부
- 4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 설사, 붉은변 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.

- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용(먹는) 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 파리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병성 증상 (neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화가 나타날 수 있습니다.
- 6) 폴산(엽산)이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성)손상 (glucose-toleranceimpairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증 (hyperuricemia :혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 투여합니다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 4) 복용시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용합니다.
- 5) 지방과부하로 특별한 위험이 상정되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 레보도파 함유 약물과 병용(함께 복용)투여하지 않습니다.

6. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검시시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 저장시의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- 3) 오(잘못)사용 : 남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

- 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
- 어린이 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- 최신의약품 정보 : 이지드럭(ezdrug.kda.go.kr)참조
- 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고지한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.
- 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

작성일(2010년 06월 10일) 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr) 또는 소비자상담실(080-612-8690) 수신자부담료 문의하시어 확인할 수 있습니다.



제일약품 주식회사
www.jeilpharm.co.kr
경기도 화성시 제1구 백담로 117-1

제주점

주식회사 동구제약
DONGKOO PHARM.CO.,LTD
경기도 화성시 향남읍 상곡리 901-3