

종합감기약

영콜
연질캡슐

■코막힘 ■재채기 ■인후통 ■관절통 ■근육통

기침
콧물

두통

발열

오한

[원료약품 및 그분량] 1캡슐(860mg) 중

아세트아미노펜 (KP)	162.50mg
클로르페니라민말레산염 (KP)	1.25mg
수도에페드린염산염 (USP)	15.00mg
덱스트로메토르판브로모화수소산염수화물 (KP)	8.00mg

첨가제(타르색소) : 황색5호

[성상] 무색내지 연한 주황색의 투명한 내용물을 함유한 진한 주황색의 투명한 타원형 연질캡슐

[효능·효과] 감기의 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량] 성인 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
- 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

2. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

- 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것. 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등.
- 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시킬 것.
- 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의깊게 모니터링해야 한다.

3. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것.

- 복용하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 장기 연용(계속 복용)하지 말 것.

4. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 자사포장단위

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.
- 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 작성일자(2010년 8월)이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-784-7800

설명서 작성일 : 2010.08