

우수의약품 KGMP 적격업체

일반의약품 | 분류번호 : 03160



하루에 한번 먹는 고단위 종합영양제

모메큐정

의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1 정중

토코페롤아세테이트 50%(KPC)	60mg(비타민E로서 30IU)
직타용아스코르빈산(별규)	650mg(아스코르빈산으로서 630mg)
폴산(KP)	0.4mg
티아민질산염(KP)	25mg
리보플라빈(KP)	12mg
니코틴산아미드(KP)	100mg
피리독신염산염(KP)	10mg
시아노코발라민(KP)	0.012mg
판토텐산 칼슘(KP)	30mg
황산아연(USP)	65.6mg(아연으로서 23.9mg)
셀레늄 함유 건조효모(KPC)	37mg(셀레늄으로서 20μg)
첨가제(동물유래성분):유당수화물(소,우유)	

[성 상] 갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

○ 비타민 E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후의 체력저하시
- 노년기

○ 이 약에 포함된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

· 다음 증상의 완화

: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨통증) 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

· 각기

· 눈의피로

○ 아연의 보급

[용법·용량]

성인 1회 1정, 1일 1회 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 12개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 1세 미만의 영아(갓난아기)
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 과수산노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 4) 임부, 수유부
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장애(신장장애) 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 위장관 질환

3. 부작용

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 피부염, 땀·호흡기 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용(먹는) 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 한다.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여하지 않는다.
 - 가) 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 나) 레보도파
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오용(잘못사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 60정, 120정

[사용기한] 제조일로부터 36개월

[소비자상담실] 080-010-1114

■ 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로, 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

■ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 개설자 및 의약품 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

■ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 소비자의 정당한 피해를 보상해 드립니다. 기타 사항은 당사 고객센터로 문의하여 주시기 바랍니다.

■ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보를 참조하십시오.

*기타사항 및 첨부문서의 작성일자(2011년 1월)이후 변경된 내용은 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

설명서 작성년월 : 2011년 1월

제조사 : 동방에프티엘(주) 경기도 화성시 향남읍 상신리 904-5

판매자 :  **광동제약(주)**
경기도 평택시 모곡동 440-2