

전문의학물

분류번호 : 218

클로브이정 Clo V Tab. (클로피도그렐항산염)

(한약료부의 분류) 1정 중

주성분 : 클로피도그렐항산염(USP) ----- 97.875mg
클로피도그렐로스 ----- 75mg)

[성질]

분홍색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

- 허혈뇌졸중, 심근경색 또는 말초동맥성질환이 있는 성인 환자에서 죽상동맥경화성 증상의 개선
- 급성관상동맥증후군(불안정성 협심증 또는 비Q파 심근경색에 있어서 약물치료 또는 관상재혈술(PCI)gent 시술을 하거나 하지 않은 경우) 및 관상동맥질환(CAD)을 받았거나 받을 환자를 포함)이 있는 성인 환자에서 죽상동맥경화성 증상심혈관계 이상으로 인한 사망, 심근경색, 뇌졸중 또는 불응성 허혈의 개선
- 한 가지 이상의 혈관성 위험인자를 가지고 있고, 비타민 K 길항제(VKA) 투여가 적합하지 않으며, 출혈 위험이 낮은 심방세동 성인 환자에서 뇌졸중을 포함한 죽상관전증 및 혈전색전증의 위험성 감소

[용법·용량]

- 성인** : 1. 허혈뇌졸중, 심근경색 또는 말초동맥성 질환이 있는 환자에는 클로피도그렐로스 1일 1회 75 mg을 경구투여한다. 2. 급성관상동맥증후군(불안정성 협심증 또는 비Q파 심근경색에 있는 환자에는 이 약 투여하기 1일 이전에서 1일 1회 300 mg을 부하용량(loading dose)으로 시작하고 이후에 1일 1회 75 mg을 유지용량으로 경구투여한다. 이 때 아스피린 75~325 mg을 1일 1회 1회 이하와 병용투여 하여야 한다.
- 심방세동 환자에게는 이 약으로서 1일 1회 75 mg을 경구투여한다. 이 때 아스피린 75~100 mg을 1일 1회 이 약과 병용투여 하여야 한다.
- 신장에 환자 : 신장애 환자에서 치료 경험은 제한적이다.
- 간에에 환자 : 출혈 체질의 중증도 간질환 환자에서 치료경험은 제한적이다.

이 약은 음식물의 섭취와 상관없이 투여할 수 있다.

(사용상의 주의사항)

경고
유전적으로 CYP2C9의 기능이 저하된 환자 : 유전적으로 CYP2C9의 기능이 저하된 환자는 정상 CYP2C9 기능을 가진 환자들에 비하여, 이 약의 활성 대사체의 전신 노출이 적어 항혈소판 반응이 감소되어 일반적으로 심근경색 이후 심혈관계 사건이 발생할 확률이 높으므로 CYP2C9의 기능이 저하된 환자로 확인된 경우 치료량일 또는 대체치료를 고려해야 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 출혈이 있는 환자(뇌하수체성, 두개내 출혈, 혈우병, 소화관 출혈, 요로 출혈, 기혈, 류마제 출혈 등)
- 중증의 간 손상 환자
- 수유부

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 출혈 및 출혈성 이상반응의 위험이 있으므로, 치료 중에 이런 임상적인 증상이 의심될 때마다 신중하게 혈구수 측정 또는 다른 적절한 검사가 고려되어야 한다. 이 약은 출혈 시간을 연장시키므로 출혈이 생길 수 있는 병변을 가진 환자에서, 위장관 및 인내내 병변에있는 중의하여 투여 하여야 한다. 또한 다른 항혈소판제와 마찬가지로, 이 약은 외상, 수술 또는 후천적 또는 고신성 혈소판감소증 또는 기능적인 혈소판 결손, 활성 계상성 위장관 질환, 최근의 생선, 새고기 섭취(활용 등)로 인해 출혈 위험이 증가한 환자에서는 신중하게 투여하여야 한다. 환자자 수술을 받기 전에, 항혈소판 효과가 비평가되지 않은 경우에는 수술 5일 내지 7일전에 이 약의 투여를 중단하여야 한다. 이 약을 복용하는 환자는 위장관내 병변을 야기할 수 있는 약물(아스피린과 같) 및 비스테로이드소염진통제(NSAID), 해파린, 당단백질 /b/a 저해제 또는 혈전용해제 등과 병용시 주의하여야 한다. 특히, 투여 첫째 주 및/또는 침습성 심장 처치 또는 수술 이후에 잠재출혈을 포함한 모든 출혈증상에 대하여 환자를 주의해서 관찰하여야 한다.
- 신장에 환자
중증 신장애 환자에 대한 이 약의 사용 경험에 제한적이다. 이런 환자에게 이 약은 신중하게 투여하여야 한다.
- 급성 뇌졸중 환자(7일 이내)(관련 자료가 부족하므로 투여를 권장하지 않는다.)
- CYP2C9저해제를 투여중인 환자(예, 상호작용 항 참조)
- 고혈압이 지속되는 환자
- 고령자
- 저체중 환자

4. 이상반응
이 약의 안전성은 이 약을 1년 이상을 투여한 12,000명을 포함한 44,000명 이상의 환자를 대상으로 평가되었다. 이 약의 전반적인 내약성은 연령, 성별, 인종과 관계없이 아스피린과 비슷하였다. 이상반응 발현으로 투여를 중단한 환자는 대략 아스피린과 같은 빈도(3.3%)였다. CAPRI, CURE, CLARITY, COMMIT, ACTIVE-A, ACTIVE-W 연구에서 관찰된 임상적으로 중요한 이상반응은 아래와 같다.

1. 출혈현상

- CAPRI 연구에서, 이 약과 아스피린 투여군에서 전반적인 출혈의 발생빈도는 동일였으며(93.6%), 중증의 출혈 발생빈도는 이약 투여군에서 1.4 %, 아스피린 투여군에서 1.6 %로 각각 나타났다.
- 국내에서 심파변연, 전신적인 위장관 출혈들이 이 약 투여군에서 2.0 %였었고, 이 중 0.7 %가 인원을 필요로 하였다. 반면, 아스피린을 투여한 환자군의 경우, 위장관 출혈들이 2.7 %였었고 인원이 필요한 경우는 1.1 %였다. 그 외에 기타 출혈의 발생빈도는 이 약 투여군에서 7.3 %로서, 아스피린(6.5 %의 경우보다 높았다. 그러나 이 중에서 중증의 출혈 발생빈도는 두 치료군에서 유사한 것으로 나타났다(0.6 % 대 0.4 %) 또한, 자살/자살/협동(suicidal/bruising/ haematoma)과 비출혈(epistaxis)이 가장 빈번하게 발생되었으며, 혈종, 혈노, 안구내출혈(주로 결막 부위)은 덜 빈번하게 보고되었다. 두개내 출혈들은 아스피린의 경우 0.5 %이고 이 약은 0.4 %였다.
- CURE 연구에서 위약과 아스피린을 투여받은 환자군에서보다 이약과 아스피린을 병용투여한 환자군에서 주요한 출혈 및 경미한 출혈이 증가되었다(주요한 출혈의 발생빈도 2.7 % 대 3.7 %, 경미한 출혈의 발생빈도 2.4 % 대 3.1 %). 주요한 출혈이 주로 발생되는 위치는 위장관 및 전신(puncture) 부위 등이었다. 위약과 아스피린을 투여받은 환자군과 비교하여 이 약과 아스피린을 병용투여 받은 환자군에서 생명을 위협하는 출혈의 발생빈도 증가는 통계적으로 유의하지 않았지만(8 % 대 22 %), 두 치료군에서 치명적인 출혈의 발생빈도는 차이가 없었다(두 군 모두 0.2 %), 생명을 위협하지 않는 주요한 출혈의 발생빈도는 위약과 아스피린 투여군에 비해 이 약과 아스피린 투여군에서 유의하게 높았지만(0 % 대 1.6 %), 두 치료군에서 두개내 출혈들은 0.1 %로 동일하였다.
- CURE 연구에서, 이 약과 아스피린의 병용투여군에서의 출혈률은 아래의 표와 같다(%)이다.

증 상	클로피도그렐 (+ 아스피린)* (n=6,259)	위 약 (+ 아스피린)* (n=6,303)	P-value
주요한 출혈	3.7**a)	2.7**b)	0.001
•생명을 위협하는 출혈			0.13
- 치명적	2.2	1.8	
- 5g/dL 헤모글로빈 이하	0.2	0.2	
- 수술적 중재가 요구	0.9	0.9	
- 출혈성 뇌졸중	0.7	0.7	
- 혈액적 사용이 요구	0.1	0.1	
- 수술용 요구 (≥4 units)	0.5	0.5	
- 12	1.2	1.0	
•기타 주요한 출혈			0.005
- 성상한 전신의 기능부전	1.6	1.4	
- 상강한 출혈의 기능부전	0.4	0.3	
- 2성인 시력 손상을 동반한 안구내 출혈	0.05	0.03	
- 상강한 수술을 요구	1.3	0.9	
경미한 출혈***	5.1	2.4	< 0.001

* 저대한 다른 표준요법까지 치료중 사용하였다.
**a) 클로피도그렐 + 아스피린에 의한 주요한 출혈 증상의 발현률은 아스피린에 대해 병용비율적이었던 (100 mg = 2.6 %; 100~200 mg = 3.5 %; 200 mg = 4.9 %).
**b) 위 약 + 아스피린에 의한 주요한 출혈 증상의 발현률은 아스피린에 대해 병용 비율적이었던 (100 mg = 2.0 %; 100~200 mg = 2.3 %; 200 mg = 4.0 %).
*** 출혈, 뇌출혈, 두개내 출혈

- 심방세동 환자에게는 이 약으로서 1일 1회 75 mg을 경구투여한다. 이 때 아스피린 75~100 mg을 1일 1회 이 약과 병용투여 하여야 한다.
- CURE 연구에서, 대상 환자에서 92 %가 해파린 및 저분자형 해파린을 투여 받았으며 이들 환자의 출혈률은 이 약의 전반적인 결과와 유사하였다. 최소한 수술 5일 전부터 이 약의 투여를 중단한 환자에서 관상동맥화재술이후 1월 이내에 주요한 출혈이 추가로 관찰되지 않았다(이 약과 아스피린 투여군에서 4.4 %, 위약과 아스피린 투여군에서 5.3 %).
- 관상동맥화재술이후 5일 이내에 이 약을 투여 받은 환자에서, 출혈성 증상의 발현률은 이 약과 아스피린 투여군에서 9.6 %, 위약과 아스피린 투여군에서 6.3 %였다.

- CLARITY연구에서 주요한 출혈(두개 내 출혈 또는 헤모글로빈이 5 g/dL 이상 감소하는 것과 관련된 출혈)의 발생은 두 투여군에서 유사하게 나타났다(아아스피린 투여군과 위약+아스피린 투여군에서 각각 1.3 % vs 1.1%). 이는 기존에 특정한 임상적 사용용처의 유형 또는 해파린 용법에 따른 환자 서브그룹에서 일관되었다. 치명적인 출혈의 발생 (이 약+아스피린 투여군과 위약+아스피린 투여군에서 각각 0.8 % vs 0.6 %)과 두개 내 출혈(각각 0.5 % vs 0.7 %는 두 그룹에서 낮고 비슷하게 나타났다.
- COMMIT연구에서 뇌 이외의 주요한 출혈 또는 뇌에서의 출혈은 위 의에서와 같이 두 그룹에서 낮고 비슷하게 나타났다. COMMIT연구에서 출혈이 발생한 환자수(%)는 다음과 같다.

출 혈	클로피도그렐 (+아스피린), (N=22,961)	위 약 (+아스피린), (N=22,881)	P-Value
주요한* 뇌 이외의 출혈 또는 뇌에서의 출혈**	134 (0.6%)	125(0.5%)	0.59
주요한 뇌 이외의 출혈	82 (0.4%)	73 (0.3%)	0.48
치명적	36 (0.2%)	37 (0.2%)	0.90
출혈성 뇌졸중	55 (0.2%)	56 (0.2%)	0.91
치명적	39 (0.2%)	41 (0.2%)	0.81
다른 뇌 이외의 출혈 (주요하지 않은)	831 (3.6%)	721 (3.1%)	0.005
그 밖에 뇌 이외의 출혈	896 (3.6%)	777 (3.4%)	0.004

* 주요한 출혈은 뇌에서의 출혈 또는 뇌 이외의 출혈로 사망에 이르게한 또는 수술을 필요로 하는 전신을 포함
** 주요한 뇌 이외의 출혈은 뇌에서 출혈의 증상을 경험하고 사망하였던, 영구적인 장애 또는 기능적인 장애를 야기하는 출혈을 포함한다. 이는 위약 투여군에서 0.4%, 아스피린 투여군에서 0.3%로 나타났다.
*** 위약+아스피린 투여군에서는 치명적 뇌출혈이 0.4%, 위약+아스피린 투여군에서는 0.3%, 위약+아스피린 투여군에서는 0.2%로 나타났다.

- ACTIVE-A 연구에서 주요한 출혈의 발생률은 이 약과 아스피린 병용투여군이 위약과 아스피린 투여군보다 높았으며(6.7 % 대 4.3 %). 주요한 출혈은 대부분 두개와 출혈(13.6% 대 3.5%), 주로 위장관 출혈(13.5% 대 18 %), 두개내 출혈의 발생률은 이 약과 아스피린 투여군에서 더 높았다(1.4 % 대 0.8 %). 치명적인 출혈 및 출혈성 뇌졸중의 발생률은 두 군 사이에 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다(치명적인 출혈: 1.1 % 대 0.7 %, 출혈성 뇌졸중: 0.8 % 대 0.6 %).

출 혈	발생 건수 (발생률 %)*		Hazard Ratio(%) (95% CI)	P-Value
	클로피도그렐 + 아스피린 (N=3,772)	위약 + 아스피린 (N=3,732)		
주요한 출혈**	251 (6.7)	162 (4.3)	1.6 (1.3 to 1.9)	(0.0001)
중증의 출혈**	190 (5.0)	122 (3.2)	1.6 (1.3 to 2.0)	(0.0001)
치명적인 출혈	42 (1.1)	27 (0.7)	1.6 (1.0 to 2.5)	0.0080
두개내 출혈**	54 (1.4)	29 (0.8)	1.9 (1.2 to 2.9)	0.0056
경미한 출혈	408 (10.8)	175 (4.6)	2.4 (2.0 to 2.9)	(0.0001)
모든 출혈*	1014 (26.9)	651 (17.2)	1.7 (1.5 to 1.8)	(0.0001)

*a) 관찰된 사례
b) 출혈은 아니었으며 출혈성 뇌졸중으로 판단된 환자 1명 포함
* 클로피도그렐+아스피린 투여군에 대한 주요한 출혈의 발생률: 65세 미만=3.3 %, 65~79세=4.7 %, 75세 이상=6.3 %, 아스피린 단독 투여에서의 연례에 따른 주요한 출혈의 발생률: 65세 미만=1.9 %, 65~79세=3.9 %, 75세 이상=6.0 %
* 출혈성 뇌졸중과 경미하 혈종을 포함한 모든 두개내 출혈

- ACTIVE-W 연구에서, 주요한 출혈의 발생은 이 약과 아스피린 병용투여군과 경구용 항응고제 투여군 간에 유의한 차이가 없었다. 치명적인 출혈은 두 군에서 모두 낮게 보고되었다(0.21 % 대 0.33 %). 출혈의 총 발생률은 경구용 항응고제 투여군에 비해 이 약과 아스피린 병용투여군에서 유의하게 높게 나타났다.

출 혈	발생 건수 (발생률 %)		Hazard Ratio(%) (95% CI)	P-Value
	클로피도그렐 + 아스피린 (N=3,333)	경구용 항응고제 (N=3,371)		
주요한 출혈*	101 (3.03)	93 (2.87)	1.09 (0.82 to 1.45)	0.5101
중증의 출혈*	69 (2.07)	63 (1.87)	1.10 (0.78 to 1.55)	0.5554
치명적인 출혈*	7 (0.21)	11 (0.33)	0.64 (0.25 to 1.65)	0.3569
두개내 출혈**	13 (0.39)	23 (0.68)	0.52 (0.26 to 1.05)	0.1012
경미한 출혈	208 (6.24)	238 (7.06)	0.88 (0.73 to 1.06)	0.1761
모든 출혈	644 (19.31)	556 (16.49)	1.20 (1.07 to 1.34)	0.0026

a: 관찰된 사례 b: 출혈은 아니었으며 출혈성 뇌졸중으로 판단된 환자 1명 포함

- ACTIVE-A 연구와 ACTIVE-W 연구는 각각 ACTIVE 프로그램에 속한 개별 연구로서, 한 가지 이상의 혈관성 사건의 위험인자를 가지고 있는 심방세동 환자를 대상으로 하였다. 이들 환자 중, 피하자 등록 가운데 근거하여, Vitamin K 길항제(와파린 등)를 투여 받기에 적합한 환자는 ACTIVE-W 연구에 배정되었고, Vitamin K 길항제를 투여 받기에 적합하지 않은 환자(Vitamin K 길항제를 투여 받을 수 없거나 환자가 항하지 않는 경우는 ACTIVE-A 연구)에 배정되었다.
- ACTIVE-W 연구 결과, Vitamin K 길항제가 이 약과 아스피린 병용투여군에 비해 더 효과적 높았다.

- 혈액학적 장애(호중구감소증/무과립구증 등)
 - CAPRI 연구에서, 중증의 호중구감소증(0.450 G/L)이 6세 발생하였는데, 이중 이 약 투여군에서 4.0(0.04 %), 아스피린 투여군에서 2.8(0.02 %) 발생하였다.
 - 이 약을 투여한 환자 9,569명중 2명의 호중구 수 0.01가 낮았으나, 아스피린을 투여한 9,566명의 환자에서는 이러한 증상이 나타나지 않았다. 이 약 투여군의 4명의 환자 중, 1명은 세포독성 화학요법을 받고 있었으며 다른 1명은 이 약의 일시적 중단 후 회복되어 임상시험에서 회복되었다.
 - * 이 약과 화학요법에 의한 중증의 호중구감소증 발생률은 0.8 %이었다(0.450 G/L).
 - 재생물학적 빈혈이 이 약 투여군에서 1대 발생하였다. 중증의 혈소판감소증(80 G/L) 발생률은 이 약 투여군에서 0.2 %, 아스피린 투여군에서 0.1 %였으며, 혈소판 수가 30 G/L 이하로 감소한 사례는 매우 드물게 보고되었다.
 - CURE 연구에서, 혈소판감소증 발생률은 이 약과 아스피린 투여군에서 19%, 위약과 아스피린 투여군에서 24%, 무과립구증 발생률은 각각 3명씩 으로 유사하게 나타났다.
 - 이 약의 골수독성 위험은 상당히 낮지만, 이 약을 투여한 환자에서 일 또는 다른 감염 증상이 나타날 경우에는 골수독성의 가능성을 고려해야 한다.

3) 위장관계 증상

- CAPRI 연구에서, 전반적으로 이 약을 투여한 환자에서 위장관계 증상(예, 복부통, 소화 불량, 위장염 또는 변비)의 발생빈도는 27.1 %인데 비해, 아스피린을 투여한 환자에서는 29.8 %였다. CURE 연구에서의 위장관 증상의 발생빈도는 이 약과 아스피린 투여군에서 11.7 %, 위약과 아스피린 투여군에서 12.5 %였다.
- CAPRI 연구에서, 소화성식 위 또는 십이지장) 궤양의 발생빈도는 이 약 투여군은 0.7 %, 아스피린 투여군은 1.2 %이었다. CURE 연구에서는 소화성식 위 또는 십이지장) 궤양의 발생빈도는 이 약+아스피린 투여군에서 0.4%, 위약과 아스피린 투여군에서 0.3 %였다.
- CAPRI 연구에서, 상신는 아스피린 투여군에서 3.4 %인데 비해 이 약 투여군에서는 환자의 4.5 %에서 보고되었다. 하지만, 중증은 거의 나타나지 않았으며(이 약 투여군 0.2 %, 아스피린 투여군 0.1 %). CURE 연구에 의하면, 십자가 이 약과 아스피린 투여군에서 2.1 %, 위약과 아스피린 투여군에서 2.3 % 나타났다.
- CAPRI 연구에서, 위장관계 이상반응으로 투여를 중단한 환자의 빈도는 이 약 투여군에서 3.2 %, 아스피린 투여군에서는 4.0 %였다. CURE 연구에 의하면, 위장관계 이상반응으로 인해 투여가 중단된 환자의 빈도는 위약과 아스피린 투여군에서 0.8 %인데 비해서 이 약과 아스피린 투여군에서는 0.9 %였다.

- 발진 및 기타 피부 질환
 - CAPRI 연구에서, 이 약을 투여한 환자군 의 피부 및 피부 부속기관에서 이상반응 발생빈도는 15.8 %였었고(중증 이상반응 0.7 %), 아스피린을 투여한 환자군에서는 13.1 %였었다(중증 이상반응 0.5 %). 이는 기존에 특정한 임상적 사용용처의 유형 또는 해파린 용법에 따른 환자 서브그룹에서 일관되었다. 치명적인 출혈의 발생 (이 약+아스피린 투여군과 위약+아스피린 투여군에서 각각 0.8 % vs 0.6 %)과 두개 내 출혈(각각 0.5 % vs 0.7 %는 두 그룹에서 낮고 비슷하게 나타났다.
 - CAPRI 연구에서, 피부 및 피부 부속기관의 이상반응으로 이 약의 투여를 중단한 환자의 전반적인 발생 빈도가 15 %인 반면, 아스피린 투여군에서는 0.8 %였다.
 - CAPRI 연구에서, 피부 및 피부 부속기관의 이상반응으로 이 약의 투여를 중단한 환자의 발생 빈도가 이 약과 아스피린 투여군에서는 0.7 %, 위약과 아스피린 투여군에서는 0.3 %였다.
 - CAPRI와 CURE 연구에서 이 약과의 관련성과 관계없이 이 약을 투여받은 환자군에서 구 발현율이 2.5 % 이상인 이상반응은 아래와 같다. 평균 치료기간은 20개월이었고, 최종 치료기간은 3년이었다.

* CAPRI 연구에서, 이 약을 투여한 환자군 에서 2.5 % 이상 나타난 이상반응

증 상	%빈도(%증단)		증 상	%빈도(%증단)	
	클로피도그렐 (n=3,599)	아스피린 (n=3,598)		클로피도그렐 (n=3,599)	아스피린 (n=3,598)
전신	총통	8,30(2)	8,30(3)	근육-관절기계	
	사교성 상태	7,90(1)	7,30(1)	관절통	6,30(1)
	인플루엔자 유사질환	7,5(0.1)	7,0(0.1)	요통	5,80(1)
	통증	6,40(1)	6,30(1)	혈소판, 출혈 및 응고	
	피로	3,30(1)	3,40(1)	자반/좌상 비출혈	5,30(3)
심혈관계	부종	4,1(0.1)	4,5(0.1)		2,90(2)
	고혈압	4,3(0.1)	5,1(0.1)	정신계	
중추 및 말초신경계			우울	3,6(0.1)	3,9(0.2)
	두통	7,60(3)	7,20(1)	호흡기계	
소화기계	헛기증	6,20(2)	6,70(3)	상부호흡기계 감염	8,7(0.1)
	복부통	5,60(7)	7,1(1)	호흡 곤란	4,50(1)
	소화불량	5,20(6)	6,10(7)	비염	4,20(1)
	설사	4,50(4)	3,40(3)	기관지염	3,70(1)
	구역	3,40(5)	3,80(4)	기침	3,1(0.1)
대사 및 영양			피부 및 부속기관		
	고콜레스테롤증	4,0(0)	4,4(0.1)	발진	4,20(5)
			소양증	3,30(3)	
			비뇨기계		
			요로 감염	3,1(0)	3,5(0.1)