

조제용

미오큐정



300정

조아

【원료약품 및 그 분량】 1 정 중

니코틴산아미드(KP) 250 mg
피리독신염산염(KP) 50 mg

첨가제(타르색소) : 황색 203 호

【효능 및 효과】

- ◇ 다음 경우의 비타민 B₆ 보급 - 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) 체력 저하시
- ◇ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법 및 용량】 만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1 일 2 회, 1 회 1 정

【성 상】 노란색의 장방형 정제

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【수신자부담고객상담실】 080-988-8888

【제 조 자】 조아제약(주) 본사 : 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7 공 장 : 경남 함안군 함안면 파수리 465

【사용상의 주의사항】 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 2) 만 3 개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것) 1) 만 1 세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 임부, 수유부 3. 부작용 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것. : 구역, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감 2) 피리독신을 1 일 500 mg~2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 3) 고용량 투여에 의해 소회성 케양을 촉진시키고 당내 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 4. 일반적 주의 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다. 3) 1 개월 정도 투여하여도 증상이 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다. 5. 상호작용 1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용) 투여하지 않는다. - 레보도파 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다. 3) 오·남용(오용·잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

제조번호 : S02202

사용기한 : 2014.01.26



Rev.0

806446 025315 8