



【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(1,580mg) 중

셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서 50μg)(별규)	38.462mg	✓
베타카로틴30%현탁액(베타카로틴으로서 7.5mg)(KPC)	25.00mg	✓
아스코르브산(KP)	300.00mg	✓
토코페롤아세테이트(비타민E로서 100IU)(KP)	100.00mg	✓
리보플라빈(KP)	12.00mg	✓
피리독신염산염(KP)	7.30mg	✓
시아노코발라민0.1%(시아노코발라민으로서 1.8μg)(KPC)	1.80mg	✓
니코틴산아미드(KP)	20.00mg	✓
티아민질산염(KP)	12.34mg	✓
감마오리자놀(KPC)	10.00mg	✓
우르소데옥시콜산(KP)	5.00mg	✓
유비데카레논(KP)	10.00mg	✓
산화아연(아연으로서 15mg)(KP)	18.70mg	✓

첨가제(식약청인정타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색1호

【성상】 적갈색의 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】 1. 다음 경우의 비타민 A, C, E, B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로, 임신·수유기 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시, 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상)

- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

- 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

3. 아연의 보급

【용법·용량】 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

【사용상 주의사항】

1. 경고

임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 복용하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신한 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000IU/일 이상 투여하지 않는다.

(비타민 A결핍증 환자는 제외)

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 만 1세 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 과산화노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부, 수유부
- 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장애(신장장애) 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 위 장관(장자) 질환
- 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 9) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 부작용

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
: 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 위부(상복부)불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 붉은 변, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위 장관(창자)장애, 소화장애, 상복부통증, 구역질, 저혈압, 폐부종(부기)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

5. 일반적주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 한다.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여하지 않는다.
가) 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제 나) 레보도파
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

7. 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

외국에서 임신 전 3개월부터 임신 초기 3개월까지 비타민A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형 발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 보고되어 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보충을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에서 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

8. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용), 남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[포장단위] 50연질캡슐, 100연질캡슐 [사용기간] 제조일로부터 24개월

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 / 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

[제조원] **RP 알엔피코리아(주)** [판매원]



경기도 화성시 향남읍 상신리 906-6



중성 대웅제약

경기도 화성시 향남읍 상신리 906-10

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.
구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 작성일자(2011년 11월) 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 소비자상담실 : 02-568-0051 • 반품 및 교환처 : 02-832-5913