



MOTHER'S PHARM

고함량 기능성 활성비타민

더블백정

고단위 활성비타민+항산화제+미네랄 함유 종합영양제

Hanmi

일반의약품 | 분류번호 : 319

Double 100

[원료약품 및 분량] 이 약 1정 중

벤포티아민(KPC)(티아민염산염으로서 36.15mg)	50mg
리보플라빈(KP)	50mg
니코틴산아미드(KP)	50mg
판토텐산칼슘(KP)(칼슘으로서 2.52mg)	30mg
피리독신염산염(KP)	50mg
0.1%시아노코발라민(KPC)(시아노코발라민으로서 50μg)	50mg
중수석산콜린(DAB)	50mg
이노시톨(KP)	50mg
비오틴(EP)	0.2mg
폴산(KP)	0.4mg
산화아연(KP)(아연으로서 17.03mg)	21.2mg
제피아스코르브산(KPC)(아스코르브산으로서 101.05mg)	104.17mg
셀레늄함유건조효모(KPC)(셀레늄으로서 22.1μg)	17mg
콜레칼시페롤과립(KPC)(비타민D로서 400IU)	4mg
산화마그네슘(JP)(마그네슘으로서 60.3mg)	100mg
무수인산수소칼슘(KP)(총 칼슘으로서 31.93mg)(칼슘으로서 29.41mg)	100mg
감마오리지놀(KPC)	5mg
DL-메티오닌(KP)	50mg

첨가제(타르색소) : 황색5호 알루미늄레이크, 황색4호 알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크

[성상] 주황색의 장방형 필름코팅정

[효능 및 효과]

○ 다음경우의 비타민 D, B1, B2, B6, C)의 보급

－ 육체피로－임신·수유기－병중·병후의 체력저하시－발육기－노년기

－이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 비타민D(콜레칼시페롤) •뼈, 이의 발육불량 •구루병의 예방
- 비타민B1(벤포티아민) •다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등) •각기 •눈의피로 •비타민B2(리보플라빈), 비타민B6(피리독신염산염)
- 다음 증상의 완화 : 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염

○ 아연의 보급

[용법 및 용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1회 1정씩 1일 1회 복용

[사용상의 주의사항]

(1) 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 과칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 3) 만 1세 미만의 영아 4) 신결석 환자 5) 중증(심한증상)의 신부전 환자

(2) 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여

를 피한다. 3) 과수산노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 4) 임부, 수유부 5) 심장·순환기계기능 장애 환자 6) 신장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 강심배당체를 투여 중인 환자 9) 위장관 질환 10) 임부 11) 이 약은 황색 5호를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

(3) 부작용

1) 이 약의 투여에 의하여 다음과 같은 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다. : 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 홍반, 설사 중추신경계 기능저하, 피부부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관 장애, 소화 장애, 상복부통증, 폐부종, 부전수축 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 3) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 4) 염산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다. 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 7) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

(4) 일반적주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다. 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

(5) 상호작용 1) 항알도스테로제, 트리암테덴과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 한다. 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께복용)투여하지 않는다. 가) 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제 나) 레보도파 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

(6) 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

1) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

(7) 임상검사치에의 영향

1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

(8) 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다. 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기. 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

[포장단위] 자사포장단위

[제품문의처] 02)3485-0434

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 설명서 최종 작성연월일 : 11.12.28 ※ 이 제품설명서 최종 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전청 의약품전자민원창구(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) "의약품등 정보" 란을 통해 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

[제조원] 한국콜마(주) / 충남 연기군 전의면 신정리 618-3

[판매원] 한미메디케어(주) / 서울시 송파구 방이동 48-9