

빅코민백 정

【성분·함량】 1정 중

콜린타르타르산염 (DAB)	100mg
이노시톨 (KP)	100mg
γ-오리자놀 (KPC)	10mg
티아민질산염 (KP)	100mg
리보플라빈 (KP)	100mg
니코틴산아미드 (KP)	100mg
폴산 (KP)	0.5mg
판토텐산칼슘 (KP)	100mg
피리독신염산염 (KP)	100mg
d-비오틴 (USP)	0.5mg
시아노코발라민 (KP)	0.5mg
적타용아스코르브산97%(아스코르브산으로서 58.2mg)(별규)	60mg
유당수화물(기원: 소, 사용부위: 우유)	
첨가제(식약청인정 타르색소): 황색5호 알루미논레이크, 황색203호 알루미논레이크	

【성상】 노란색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 비타민 B₁(티아민질산염)
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨걸림 등)
 - 각기
 - 눈의피로
 - 비타민 B₂(리보플라빈), 비타민 B₆(피리독신염산염)
 - 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】

만 8세 이상 어린이 및 성인: 1일 1회, 1정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람이 이 약을 복용하지 말 것.
 - 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 3개월 미만의 젖먹이
 - 심한 증상의 신부전 환자
 - 신장(콩팥)결석 환자
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 감심배당체를 투여 중인 환자
 - 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
 - 임부

- 8) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 저혈압, 얼굴덜아름, 심박동불규칙, 피부발진
 - 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 3) 피리독산을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체 의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(요산과다증)(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 - 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의사항
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
 - 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 45정, 90정

- ※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 우수 의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중에 변질 또는 파손되거나 사용기한이 경과된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr> → 정보마당 → 의약품등 정보)을 참조하세요.
- ※ 본 제품 첨부문서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.arlico.co.kr)의 제품정보 또는 제품 문의처 전화(080-585-0004)를 통해 확인할 수 있습니다.

판 매 원



종근당

충남 천안시 서북구 성거읍 오색당리 15-20

제 조 원



충북 진천군 광혜원면 화죽리 160-17
<http://www.arlico.co.kr>

개정년월일 : 2012. 04. 16.

SI12157/01