

일반의약품

분류번호 : 03160

향산화제가 보강된 고품질 기능성 비타민

파워빅타민정

POWER BICTAMIN Tab.

[성분 함량] 1정 중

벤포티아민(티아민염산염으로서 36.15mg)(KPC).....	50mg
리보플라빈(KP).....	50mg
니코틴산아미드(KP).....	25mg
판토텐산칼슘(KP).....	50mg
파리독신염산염(KP).....	50mg
폴산(KP).....	200µg
시아노코발라민(KP).....	50µg
콜린타르타르산염(DAB).....	50mg
이노시톨(KP).....	50mg
비오틴(USP).....	50µg
산화아연(아연으로서 15mg)(KP).....	18.7mg
제피아스코르브산(아스코르브산으로서 50mg)(KPC).....	52.1mg
푸르셀타이민(KPC).....	5mg
우르스데옥시콜산(KP).....	10mg
감마오리자놀(KPC).....	5mg

첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호, 황색203호

첨가제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(소, 우유)

[성 상] 갈색의 장방형 필름코팅정

[효능 효과]

1. 다음 경우의 비타민(B1, B2, B6)의 보급

- 육체피로

- 임신·수유기

- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시

2. 다음 증상의 완화

- 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨 결림 등)

- 각기

- 눈의 피로

- 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

3. 아연의 보급

[용법 용량] 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1~2정 식후복용

[사용상 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

① 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

② 심한 증상의 신부전 환자

③ 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), 락포유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

① 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

② 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- ① 의사의 치료를 받고 있는 환자
- ② 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- ③ 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는상태)
- ④ 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- ⑤ 심장·순환기계기능 장애 환자
- ⑥ 신장(콩팥)장애 환자
- ⑦ 저단백혈증 환자
- ⑧ 감심배당체를 투여 중인 환자
- ⑨ 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- ⑩ 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- ① 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(인인염), 식욕부진, 복부(배부)팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 폐부(부기)증(부기)
- ② 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- ③ 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- ④ 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- ⑤ 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucosetolerance impairment : 신체 의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- ⑥ 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 우울설사부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- ⑦ 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- ⑧ 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- ⑨ 우발적으로 과량복용 한 경우
- ⑩ 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- ① 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- ② 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- ③ 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- ④ 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- ① 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- ② 직사광선을 피하고 뭄 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- ③ 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장 방법] 기밀용기, 실온(1~30℃ 보관)

[포장 단위] 자사기준

[사용 기간] 제조일로부터 36개월

- 본 약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 따라, 적당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 소비자 상담실(전화 및 교환처) : 080-700-8487 <http://www.koreaprime.co.kr>

개정일자 : 2012. 05

판매처 : 광동제약(주)

경기도 평택시 모곡동 440-2

제조자 : 한국프라임제약(주)

전북 완주군 봉동읍 둔산리 865-1,2