

영진약품



비타민FS (에프에스)

[원료약품의 분량] 이 약 1정중

건조비타민A초산염 (별규)	4mg
(비타민A로서 2,000IU)	
토포페콜아세테이트50%(KPC)	120mg
(비타민E로서 60IU)	
제피아스코르빈산(KPC)	312.5mg
(아스코르빈산으로서 300mg)	
리보플라빈(KP)	50mg
티아민질산염(KP)	50mg
셀레늄 함유 건조효모 (KPC)	46.25mg
(셀레늄으로서 25μg)	
산화아연 (KP)	12.45mg
(아연으로서 10mg)	
폴산(KP)	0.25mg
(폴산으로서 250μg)	
당귀엑스산(KPC)	50mg
(원생약으로서 217.5mg)	
길경엑스산(KPC)	30mg
(원생약으로서 111mg)	
작약엑스산(KPC)	38mg
(원생약으로 223.5mg)	

[성상] 장방형의 적갈색 필름코팅정

[효능효과]

다음 경우의 비타민 A, E, B₁, B₂, C의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)·각기·눈의피로
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
 - 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방
 - 아연의 보급

[용법용량]

12세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 2회 복용한다

[사용상 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - (2) 만 3개월 미만의 젖먹이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보충을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
- (4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- (5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (6) 신장장애 환자
- (7) 저단백혈증 환자
- (8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우(다음 각호의 배합성분별 이상반응을 기재할 것)
- 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 붉은 변, 구역, 식욕부진, 복부팽만감, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- (5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (6) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한 것) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈형성증) 위험을 높일 수 있다.
- (7) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- (8) 우발적으로 과량복용 한 경우.
- (9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우.

5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 복용 시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- (3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.
- (4) 각종 요검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- (5) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
- (6) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전 후에는 피할 것.

6) 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것(괄호안의 내용은 필요할 경우에 기재할 것).
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것(용기 등에 표시가 잘 되어있어 오용할 소지가 없을 경우에는 기재하지 않아도 된다.).

[포장단위] 60정

[보관조건] 차광, 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

- ※ 의사, 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 의원, 병원, 도매상에서 교환하여 드립니다.
- ※ 이 문서의 작성일자(2012년 7월 31일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 소비자상담실에서 확인하실 수 있습니다.

〈문의전화〉 소비자상담실 080-990-8200 /

홈페이지 : www.yungjin.co.kr

제조판매원 : 영진약품공업(주)

공 장 : 경기도 화성시 무하로 66

문서최초일 : 2012년 07월 31일