

# 효과빠른종합감기약 (생약성분함유)



## 기가콜 캡슐

이 약을 사용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어주시기 바라며, 제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(630mg) 중

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 갈근관엑스(10→1)(KC) | 116.67mg |
| 에렌지마드(KP)       | 180mg    |
| 카페인무수물(KP)      | 25mg     |
| 클로르페니라민말레산염(KP) | 1.25mg   |
| 노스카민(KP)        | 8mg      |

※ 첨가(종물류제) : 유당수화물(기침등물 : 소, 사용부위 : 유유)

[내 용 량] 2캡슐×6도 = 12캡슐

[성 상] 캡슐의 분말이 흰 상부 녹색, 하부 미황색의 경질캡슐

[효능·효과] 감기의 재증상(어려 증상)인 코막힘, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오물(흔들리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량]

만 15세 이상 : 1회 2캡슐, 11세 이상 - 만 15세 미만 : 1캡슐

만 8세 이상 - 만 11세 미만 : 1캡슐을 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 전식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만3개월 미만의 영아(젖먹이)
- 4) MAO제제(항우울제, 항정신병제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 5) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해기침을 그치게 하기(가래)제, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(코)염증 경구제, 말미잘, 알레르기약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화)가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것)
- 2) 만 3 개월 미만의 영아(젖먹이)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영(젖먹이)·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위산이식제(제산) 등이 있는 사람, 글이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장 문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 7) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이노제를 복용하는 사람
- 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 9) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드 등 다른약물을 투여 받고 있는 사람)

10) 다음과 같은 기침이 있는 사람

출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 되는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

11) 이 약은 황색호산염(로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상할 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우  
발진·발적(종혈)되어 붉어짐, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화불조, 위부불쾌감, 난청, 부종, 이명.
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상 증상이 나타난 경우  
① 속(아나필락시스) : 복통후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.  
② 피부점막안중후군(스티븐스-존슨중후군), 중증성표피괴사증(리엘중후군) : 고열을 동반하고 발진·발적(종혈)되어 붉어짐, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈막에 나타날 수 있다.  
③ 천식  
④ 긴가늡장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다.  
⑤ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.  
⑥ 위알도스테론증 : 오물이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있다.(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고염, 부종(부기), 체중증가) 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것)  
⑦ 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 증상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.  
3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜 것.
- 2) 정기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 4) 복용시에는 음주하지 말 것.
- 5) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제 이노제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 티아지드계 이노제(트리클로르메타이드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보증을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않 것.

[저장방법 및 사용기간] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

[포장단위] 12캡슐

개설일 : 2012. 08. 21

※ 본 제품은 '의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)'에 따라 제조 및 품질관리를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.  
※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서 작성일자(2012년 08월 21일) 이후 변경된 내용은 대화제약(02-6716-1078)으로 문의하시기 바랍니다.  
※ 약품의 용어설명 및 기타 자세한 약품정보는 이드링크(<http://ezdrug.kda.go.kr>) - [정보마당] - [의약품종전보]를 참조하시기 바랍니다.

제조사 : 정우신(약주) / 충청남도 아산시 신창면 서부로 700번지 60

제조의뢰 및 판매처 :



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남천동 1056-16  
공정 : 강원도 황성동 황성동 한우로 495  
<http://www.dhpharm.co.kr>