

영산화 고당량 활성비타민

몸엔 비타 정

근육통

관절통

신경통

육체피로

체력저하

눈의 피로

구내염

【원료약품 및 그 분량】 1정(1,100mg)중

히드록스코발라미아세트산염(K ₂)	750μg
(히드록스코발라민으로서 718μg)	
폴산(KP)	0.25mg
토코페롤아세이트50%(KPC)	50mg
(비타민E로서 25U)	
푸르셀타이민(KPC)	50mg
리보플라빈부티레이트(K ₂)	5mg
파리독신염산염(KP)	50mg
니코틴산아미드(KP)	50mg
아스코르브산(KP)	500mg
우르스다우시콜산(KP)	15mg
산화아연(KP)(아연으로서 15mg)	18.7mg
셀레늄함유건조효모(KPC)(셀레늄으로서 25μg)	25mg

【성 상】 적색의 필름코팅정제

【효능·효과】

- 다음경우의 비타민 B1, B2, B6, C, E의 보급
- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨 결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염, •눈의 피로 •각기
 - 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
 - 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방
- 아연의 보급

【용법·용량】

만8세이상 어린이 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 60정, 120정, 병포장, 리셀

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 레보도파
 - 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고요산산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성 대장염 등의 위장질환 환자 5) 심장·순환기계기능 장애 환자 6) 신장장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
 - 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
- 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우, 위부불

조감, 설사, 변비, 발진, 발적·종출되어 붙어짐, 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부문)팽만감, 포부염, 땀·호흡기 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화 장애, 심복부통증, 저혈압, 피부중, 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 여스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 피임약 등을 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 파라독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 7) 고용량 투여에 의한 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 9) 형알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 10) 우발적으로 과과복용 한 경우 1) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜 것
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
- 3) 각종 요감사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사자에 영향을 줄 수 있다. 5) 녹차, 홍차 등 탄산을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 놓지 말 것.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변태·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처 약상을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회고시 소비자 분쟁기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(ledrug.kda.go.kr) 의약품정보를 참조하십시오.

※ 본 첨부문서 작성일자(2013년 2월)이후에 변경된 내용은 소비자상담센터로 02-521-2688에서 확인하실 수 있습니다.

제 조  **한풍제약**

서울특별시 서초구 방배동 981-52

 www.hanpoong.co.kr

 고객상담실: 02-521-2618