

고함량 기능성 비타민 B군
리드메가비100정

【성부·합량】1정 중

반포타아민티아민염산염으로서 36.15 mg)(KPC)	50 mg
니코틴아미이드(KP)	100 mg
제피아스코르브산아스코르브산으로서 95.96 mg)(KPC)	100 mg
티보롤린(KP)	100 mg
폴산(KP)	100 µg
핀토헤스칼슘(KP)	108.7 mg
시아노코발라민 0.1 % (시아노코발라민으로서 100 µg)(KPC)	100 mg
α-비오틴(LSP)	100 µg
클린타르타르산염(DAB)	100 mg
피리다신염산염(KP)	100 mg
아노시톨(KP)	100 mg
유비데카글린(KP)	5 mg
γ-오리자놀(KPC)	10 mg
시험하이드로이언으로서 25 mg)(KPC)	312 mg

첨가제(타르색소):청색호 적색 40호 황색 203호
첨가제(동물유래성분):유당(정당)수화물(소유유)

【서사】가새이 자바청 피르크티제

【해설】

1. 다음경우의 비타민 B1, B2, B6, C의 보급
 - 육류피로 - 임신, 수유기 - 병중, 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(염하리통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기 - 피로피로
3. 여의 보급

【요번요량】

12세 이상 및 성인: 1일 1회 1회 1정 식후 복용

【사용상 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
- (1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia) : 혈액 속에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태 환자, 유종증(sarcoidosis) : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장기능이상 환자
 - (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - (3) 신장기능이상 환자
 - (4) 신장 중상의 심부전 환자
 - (5) 이 약은 유당(젖당)수용불능을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - (2) 고혈압이나 동맥 경화, hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태
 - (3) 임신 및 임신 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - (4) 소화성 궤양, 만성 위산 과다증, 만성 신장 질환 부분에 나타나는 다발성 등의 위장질환 환자

- (5) 심장·순환기계기능 장애 환자
(6) 신장(콩팥)장애 환자
(7) 저단백혈증 환자
(8) 강심배당체를 투여 중인 환자
(9) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이의의 보상을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
상당 시 가능한 한 이 청문회의 소지를 할 것.
 - (1) 이의의 투표에 의하여 대의의 승인이 있을 경우 구역, 구도, 설사, 물론 내, 식목부전, 복부내부부전, 변비, 저혈압, 골다발이음, 삼복동, 불규칙, 피부발진, 위장장애, 소화장애, 성부비(배부비)증상, 폐부비(배부비)증상
 - (2) 장기간 고음용을 투여할 경우 내성(의) 발생 시 있다.
 - (3) 피독작용 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감시(경변 또는 신경 병적 증상(neuropathy) : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - (4) 흡인이 부족한 환자에서 비단단 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상 반응이 나타날 수 있다.
 - (5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 담낭성(포도당성) 손상(glucose tolerance impairment : 식재의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperursemia, 혈중요산치 증가)을 초래하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있다.
 - (6) 대량투여로 인해 구역, 구도 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - (7) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 - (8) 형질소스테로이드, 트리단단과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - (9) 우발적(의도) 과량복용 한 경우
 - (10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - (2) 각종 오검사시에 활동의 검출을 방해할 수 있다.
 - (3) 요를 형성으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
 - (4) 녹차, 초콜릿 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항
(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
(3) 오용(직접 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기 실온(1~30℃)보관

【사용기간】제조일로부터 36개월

자살포장다의

- 본 약품명은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 손상된 제품은 구입을 통해 교환해 드립니다.
- 본 제품은 오존층 파괴위험회 고시 소비자 분해하절 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상하지 않습니다.
- 약품명을 사용하기 전에 참분문을 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 약품과 함께 보관하십시오.
- 일정사항 개정하기 전 변경된 내용은 이디저널(<http://ezdesign.kda.go.kr/kda2>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 소비자상담센터 : 080-700-8487

개정일자 : 2012. 09