

메가조인트정

* 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【성분·함량】 1정 중

콘드로이틴설페이트나트륨(KPC)	400mg
푸르셀리타민(KPC)	55mg
니코틴산아미드(KP)	40mg
피리독신염산염(KP)	20mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg
리보플라빈부타이리트(KP)	8mg
γ-오리자놀(KPC)	5mg
첨가제(동물유래성분): 유당(젖당)수화물(소, 우유), 콘드로이틴설페이트나트륨(소, 연골)	
첨가제(타르색소): 청색 1호, 적색 40호, 황색 203호	

【성 상】 갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민B₁, B₂, B₆의 보급: 육체피로, 임신 수유기, 병중 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능효과는 다음과 같다 - 다음 증상(의 원화: 신경통, 근육통, 관절통(하리)통, 어깨결림 등) - 각기, 눈의 피로

【용법·용량】 8세이상 어린이 및 성인: 1회 1정, 1일 1회 식후복용

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcomatosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장골광질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 3개월 미만의 젖먹이
 - 4) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 5) 심한 중상의 신부전 환자
 - 6) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(Galactose Intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(Glucose-Galactose Malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제, 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 5) 심장, 순환기계기능 장애 환자
 - 6) 신장골광질환에 환자
 - 7) 저단백혈증 환자
 - 8) 감성배당체를 투여 중인 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진, 어지러움, 일출 - 다량(중량부기)
 - 2) 피라독신에 일일 500 mg~2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화에 나타날 수 있다.
 - 3) 고용량 투여에 의해 소하성 폐양을 촉진시키고 당내성(포도당내) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애, 고요산혈 증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 4) 대장투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 출혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 5) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 - 6) 할알도스테르제, 트리암테네과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - 7) 우발적으로 과량복용 한 경우 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【포장단위】 자사포장단위 【사용기간】 제조일로부터 36개월

- 의약품을 원래 용기에 깨어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(오염) 사용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
- 본 제품은 엄격한 품질관리를 펴나갑니다. 우호적이 한도는 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입한 약국, 개설자 및 의약품 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.
- 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 소비자의 정당한 피해를 보상받을 수 있습니다. 기타 사항은 당사 고객센터로 문의하여 주시기 바랍니다.
- 의약품 중개유통 및 기타 제3자의 의뢰(청탁)는 이디즈레(izurur.kda.go.kr)의약품 정보로 참조하십시오.
- * 기타사항 및 첨부문서의 개정일자 이후 변경된 내용은 고객센터(080-700-8487) 또는 (www.koreaprime.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

【제 조 자】 한국프라임제약(주)/전북 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

개정일자: 2012. 11

【판 매 원】 광동제약주식회사/경기도 평택시 모곡동 440-2



광동제약(주)