

고함량 콘드로이틴
셀레이트나트륨 600mg, 비타민 B₁₂ 함유

본탑600정

성분 · 함량 : 1정 중

γ-오리자놀(KPC)	5mg
티아민질산염(KP)	60mg
니코틴아미드(KP)	20mg
콜린타르타르산염(DAB)	40mg
판토텐산칼슘(KP)	20mg
피리독살린부타이트(KP)	20mg
이노시톨(KP)	10mg
콘드로이틴셀레이트나트륨(KPC)	600mg
피리독신염산염(KP)	10mg
시아노코발라민1000배스(KPC)(시아노코발라민으로서 60μg)	60mg
도코페롤아세테이트2배스(KPC)(비타데르로서 10IU)	20mg
첨가제(타르색소) : 청색 1호, 적색 40호, 황색 203호	
첨가제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(소, 우유), 콘드로이틴셀레이트나트륨(소, 연골)	

성상 : 갈색의 정방형 필름코팅정

용량 · 용량 : 12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

효능 · 효과 :

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, B₁₂의 보급
 - 육체피로 - 임신 · 수유기 - 노년기
 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상이 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요하리통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기 · 건의피로

사용상 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환) 신장(콩팥)질환 환자 (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과 과민반응이 있는 환자 (3) 신장(콩팥)결석 환자 (4) 심한 증상의 신부전 환자 (5) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적 인 문제가 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산이 배설되는 상태) (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 (4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자 (5) 신장(콩팥)장애 환자 (6) 저단백혈증 환자 (7) 강신배당제를 투여 중인 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부)팽만감, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진 (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. (3) 에스트로겐을 포함한 경우로 피임제를 복용하는 여성 증상은 월경(월경 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타데르를 복용할 경우 월전(월경 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다. (4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. (5) 흡산이 부족한 환자에게 비타데르 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상

반응이 나타날 수 있다. (6) 고지방 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. (7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 혈철성분전, 부종(붓기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (8) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. (9) 항일도스테로제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. (10) 우발적으로 과량복용 한 경우 (11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. (2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다. (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. (3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기간 : 제조일로부터 36개월

포장단위 : 지사포장단위

· 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 받은 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변형, 변색, 오손된 제품이 발견될 경우는 구입한 약국을 통해 교환하여 드립니다.

· 본 제품은 공공거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

· 약물을 사용할 것에 첨부문서를 주의깊게 읽어와 하에, 첨부문서를 약과 함께 보관하십시오.

· 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 이 지드락(<http://ezdrug.kda.go.kr/kida2>)에서 확인하실 수 있습니다.

· 소비자상담실 : 080-023-1897(수신자 요금부담), 판매원본사 : 02-2021-9300

개정일자 : 2012. 10

제조사 : 한국프라임제약(주)

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

판매원 : 동화약품(주)

본사 : 서울특별시 중구 서소문로9길 14

공장 : 충청북도 충주시 충주산단로 167