

향산화제가 보강된 **고함량 기능성비타민** **팩티아민골드100** 정

【성분·함량】1정 중

티아민(비타민B1)(K ₁)	95 mg
니코틴아미드(K ₃)	100 mg
피리독살(비타민B6)(K ₆)	100 mg
리보플라빈(K ₂)	100 mg
폴산(K ₉)	100 µg
판토텐산(비타민B5)(K ₅)	108.7 mg
시아노코발라민 0.1%(시아노코발라민으로서 100 µg)(K ₁₂)	100 mg
α-비타민(USP)	100 µg
콜린타르타르산염(DAB)	100 mg
피리독살(비타민B6)(K ₆)	100 mg
이노시톨(K ₇)	100 mg
푸르셀라이민(K ₁₀)	5 mg
γ-오리자놀(K ₁₁)	10 mg
산화아연(아연으로서 25 mg)(K ₁₃)	31.2 mg

참가제(타르색소)착색료 적색 40호 황색 203호

참가제(중금속류착색료)유망(착색)수화물 소, 우유

【성상】갈색의 정방형 필름코팅정

【효능효과】

- 다음경우의 비타민 B1, B2, B6, C의 보급
 - 육체피로 - 임신·수유 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(통풍, 통풍, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기 - 눈의피로
- 아연의 보급

【용법용량】

12세 이상 및 성인: 1회 1회, 1회 1정 식후 복용

【사용상 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
 - (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - (3) 신장(콩팥)결석 환자
 - (4) 심한 증상의 신부전 환자
 - (5) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 고옥살산증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- (4) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (5) 신장(콩팥)장애 환자
- (6) 저단백혈증 환자

- (7) 간질환(간염)을 투여 중인 환자
- (8) 통풍성 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 중단 시 가능한 한 이 청문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부위)팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 위장장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종
- (2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- (3) 피리독살을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia: 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간수치를 일으킬 수 있다.
- (6) 대장투여에 의해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 출혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (7) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- (8) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- (9) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 각종 요검시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- (3) 요를 백색으로 변화시켜 하여 임상검사에 의해 영향을 줄 수 있다.
- (4) 녹차, 홍차 등 단란을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 밀 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】제조일로부터 36개월

【포장단위】자사제조단위

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어하여, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 이지드네(<http://ezdrug.kda.go.kr/kda2>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 소비자상담실: 080-0223-1897(수신자 요금부담), 판매원본사: 02-2021-9300

개정일자: 2012. 09

판매원

동화약품

제조사

Prime

한국프라임제약

본사: 서울특별시 중구 시모로로 14
공통: 충청북도 충주시 충주로 167

전체 판무권: 항동동 판무인사 100