

복잡한 감기를 시원하게 쿨코프^정 종합감기약

- ✓ 오한발열 ✓ 코감기
✓ 목감기 ✓ 기침감기

국내최초 합성화 비타민
벤포티아민 함유
DSM 비타민C 함유

감기는 바이러스 감염에 의한 상기도 점막의 염증으로 모든 연령층에 빈번하게 발생하는 질환입니다. 감기를 신속하게 치료하지 않으면 만성으로 발전하여 기관지염, 축농증, 폐렴과 같은 합병증을 일으킬 수 있습니다. 비타민이 강화된 종합감기약 쿨코프는 국내최초로 합성화 비타민B2인 벤포티아민과 영국산 DSM 비타민C를 사용하여 감기 바이러스의 체력회복에 주안점을 두었습니다. 또한 대표적 해열진통성분인 아세트아미노펜과 에텐자미드를 복합처방함은 물론 감기약 대표적 양약성분들에 길경, 감초등의 한방성분을 추가하여 감기의 여러가지증상(코물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)을 해소시켜 줍니다.

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정(550mg) 중

아세트아미노펜(KP) -----	100mg	제피아스코르브산(KPC)(아스코르브산으로서 80mg) ---	83.33mg
에텐자미드(KP) -----	125mg	감초엑스산(5-1)(별규)(글리시리진산으로서 2.1mg) -----	21mg
카페인무수물(KP) -----	20mg	클로르페니라민말레산염(KP) -----	1.25mg
길경엑스산(10-1)(별규) -----	20mg	벤포티아민(KPC) -----	4.16mg
염화리소지핀(KPC) -----	10mg	리보플라빈(KP) -----	2mg
di-메틸에페드린염산염(KP) ---	8.75mg	첨가제(타르색소) : 황색5호알루미늄레이크, 황색203호알루미늄레이크, 적색40호알루미늄레이크, 청색2호알루미늄레이크	
클로페라틴염산염(JP) -----	8mg		

[성상] 주황색 또는 밝은 주황색의 양면이 불룩한 정방형 필름코팅정

[효능·효과]

감기의 증상(코물, 코막힘, 재채기, 인후통¹⁾, 기침, 가래, 오한²⁾, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량] 성인(만 15세 이상) 1회 2정, 어린이(만 8세 이상 ~ 만 15세 미만)는 1회 1정, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 진해거담제³⁾, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 멀미약, 알레르기약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수도 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 2) 만 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우라도 만 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 부종⁴⁾, 위십이지장궤양, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨곤란 등이 있는 사람, 고령자⁵⁾, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈 문제를 가지고 있는 사람
- 7) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람
- 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 9) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 10) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- 발진·발적⁹⁾, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화관출혈, 위부불쾌감, 난청⁷⁾, 부종, 이명, 배뇨곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면

2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증⁸⁾ 증상이 나타난 경우

① 속(아나필락시스): 복통후 바로 두드러기, 부종⁸⁾, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.

② 피부점막만증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후군(리얼증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.

③ 천식

④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다.

⑤ 간질성폐렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.

⑥ 위알도스테론증: 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있다.

⑦ 근병증⁹⁾: 자갈통혈증의 결과로서 근병증⁹⁾이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.

3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 장기간 계속 복용하지 말 것.

3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.(어린이의 용법·용량이 있는 경우)

4) 복용시에는 음주하지 말 것.

5) 복용하는 동안 졸음 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.

6) 비로비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

7) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 골리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로메타이저드)와 병용시 위알도스테론증이나 자갈통혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.

8) 이 약은 황색5호(선텐셀로로 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

3) 오용¹⁰⁾을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 10정

[용어해설]

1)인후통: 목구멍 통증, 2) 오한: 춥고 떨리는 증상, 3)진해거담제: 기침가래약, 4) 부종: 부기

5)발적: 충혈되어 붉어짐, 6)고령자: 노인, 7)난청: 귀먹음, 8)근병증: 근육병증, 9)중증: 심한증상,

10)오용: 잘못 사용

● 만약 유통과정 중 잘못으로 인하여 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

● 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사, 약사와 상담하세요.

● 이 첨부문서 작성일자(작성일자: 2012년 11월 20일) 이후 변경된 내용은 <http://www.cjp.co.kr>에서 확인할 수 있습니다.

● 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이ذ리드릭 ⇒ 보고마당 ⇒ 안전성보고 ⇒ 의약품유해사례보고)에 알리도록 합니다.

● 자세한 의약품정보는 이지드릭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) ⇒ 정보마당 ⇒ 의약품등 정보를 참조하시기 바랍니다.

● 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 보관하세요.

● 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

● 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.