



낮과 밤이 다른 가침감각약

메디코프

연질
캡슐

[원료약품 및 그 분량] 주아간용 1캡슐(1,200mg) 중

(주간용)

아세트아미노펜(KP)	200.00mg
구아이페네신(KP)	35.00mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	12.50mg
덱스트로메토르판브로화수소산염수화물(KP)	8.00mg
착색제(천연색소) : 락색소	

(야간용)

아세트아미노펜(KP)	200.00mg
구아이페네신(KP)	35.00mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	12.50mg
덱스트로메토르판브로화수소산염수화물(KP)	8.00mg
디펜히드라민염산염(KP)	18.75mg
착색제(천연색소) : 차차청색소	

[성상]

- (주간용) 미황색(연노랑) 내지 연한 적색의 액상 내용물이 든 적색의 투명한 정방형 연질캡슐
(야간용) 무색 내지 옅은 청색의 액상 내용물이 든 청색의 투명한 정방형 연질캡슐

[효능·효과]

- (주간용) 감기의 증상(여러증상(인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화
(야간용) 감기의 증상(여러증상(코통, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량]

- (주간용) 만 15세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용
(야간용) 주간용을 복용한지 6시간 경과 후 다음 용량을 복용하십시오. 만 15세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

[사용상의 주의사항]

(주간용)

1. 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다.
이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기) 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항만장제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해거담을 그치게 하는가래약, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염코연용 경구제, 말미약, 알레르기용약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 6세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이지후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것) 2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(갓난아기), 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(갓난아기), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다. 3) 본인 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염코염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 4) 지금까지에 의해 알레르기 증상에 발열, 발진, 관상동맥, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람 5) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나, 과양, 출혈문제를 가지고 있는 사람 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부와 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등) 다른 약물을 투여받고 있는 사람 8) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 주 이식 지속 또는 재발되는 기침, 만성기침, 발열발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진발적(출혈되어 붉어짐), 가려움, 구역구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 어지러움, 불면, 떨림, 불면 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한 증상)이 나타난 경우 ① 아나필락시스(과민성쇼크) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함

등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란한 등이 나타날 수 있다. ② 피부점막안종후군(스티븐스-존슨증후군, 중독성표피파괴사용해(리델증후군): 고열을 동반하고, 발진발적증현되어 붉어짐, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다. ③ 전신 ④ 간기능장애: 전신의 나른한 황달피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨등이 나타날 수 있다. ⑤ 간질성패렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다. ③5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 2시간 계속 복용하지 말 것 3) 복용시에는 음주하지 말 것 4) 비르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 디아제파마이드나 노펜을 대신시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것 3) 오용·잘못 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

(아간용)

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 찬술을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만 3개월 미만의 영아(간헐적이거나 4) 수유부 중임인 사람은 이 약을 복용하지 않거나 수유를 중단할 것 5) MAO 억제제(항우울제, 항정신병제, 강장조제제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

전체 기침을 그치게 하는 항기침제(7)와 다른 간 2) 약 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내약(비염)염증용 경구제, 말미, 알레르기용액, 디펜히드라민을 함유하는 제제(피부)에 적용하는 제제 포함

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(간헐적이거나) 및 만 5세 미만의 영아(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것) 2) 만 3개월 미만의 영아(간헐적이거나)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우에도 만 2세 미만의 영아(간헐적이거나) 유아는 의사의 지시를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우에만 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(간헐적이거나) 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다. 3) 본인 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에 발열, 발진, 관절통, 전신 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람 5) 간장질환, 신장기능장애, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위산(자)장폐양, 뇌나장애, 눈의 통증, 눈이 침침함 등, 배뇨소변을 농란된 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람 6) 수유부(임) 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제나 자식 혹은 재발되거나 폐양 출혈문제를 가지고 있는 사람 7) 기압 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 수유부(임) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람 8) 당뇨와 동맥관, 관절염, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람: 흡연, 전신 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 기침이 동반되는 기침, 주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열, 발진이나 지속적인 등등이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상급 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우: 발진발적증현되어 붉어짐, 가려움, 구역구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변)을 농란된 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 나타나는 중증(심한) 증상(심한) 증상이 나타난 경우 ① 아·탈락(사)과(민)진(소): 복용후 바로 두드러기, 부종(부기) 기증(부기)등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란한 등이 나타날 수 있다. ② 피부점막안종후군(스티븐스-존슨증후군) 중독성표피파괴사용해(리델증후군): 고열을 동반하고, 발진발적증현되어 붉어짐, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다. ③ 전신 ④ 간기능장애: 전신의 나른한 황달피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨등이 나타날 수 있다. ⑤ 간질성패렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다. ③5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 2시간 계속 복용하지 말 것 3) 복용시에는 음주하지 말 것 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것 5) 비르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대신시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것 3) 오용·잘못 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃) / 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

[포장단위] 10연질겉술

[사용기간] 제조일로부터 24개월

- 본 약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 약품품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와야 하며, 첨부문서를 약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 작성일자(2013년 1월) 이후 변경된 내용은 이드트릭(<http://ezdrug.kda.go.kr/kda2>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 소비자상담실: 02-568-0051

설명서 작성일 2013. 01