

살생비스몰^정

[원료약품의 분량]

비스무트차살리실산염(KPC) 262mg

침강탄산칼슘(KP) 100mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원:젖소, 사용: 우유)

첨가제(타르색소) : 적색 40호

[성 상] 분홍색 타원형의 필름코팅정**[효능·효과]** 설사, 체함, 묽은변, 토사**[용법·용량]** 만 15세 이상 성인 : 2정, 만 11세이상 - 만 15세 미만 : 4/3정, 만 8세이상 - 만 11세미만 : 1정**[사용상의 주의사항]****1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.**

- 1) 출혈 혹은 궤양이 있는 사람
- 2) 살리실산에 알레르기 반응을 보이는 환자 혹은 다른 살리실산이 함유된 약물을 복용하고 있는 사람
- 3) 만 7세 이하의 어린이
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자, 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 어린이
- 4) 다른 약물을 복용 하고 있는 사람

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사,치과의사,약사와 상의할 것.상당시 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약을 복용함으로써 드물게 이명(귀울림), 청력손상, 설사의 지속이 일어날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우
- (2) 이 약을 복용함으로써 레이 증후군이 일어날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우
- (3) 여러차례간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.
- (3) 급성의 심한 설사를 할 경우 또는 구역, 복통(배아픔), 복부팽만 등의 증상을 수반하는 설사를 할 경우에는 이 약으로 무리하게 설사를 멈추게 하면 오히려 병을 악화시킬 수 있으므로 이러한 경우에는 투여에 대하여 의사 또는 의사와 상의한다.
- (4) 복용시에는 음주하지 말 것.
- (5) 3일 이상 계속하여 복용하지 말 것.

5. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- (3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[제조발매원] 삼성제약공업(주) 본사: 서울 광진구 동일로 338 공장: 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 35**[포장단위]** 자사포장단위**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관**[소비자상담실]** 080-777-8285 / www.sspharm.co.kr**[사용기한]** 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 “의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)”에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

첨부문서최종개정연월일 : 2013. 02. 08