


Restine
Royal
Tab.



효과 좋은 정상 유산균제
레스틴로알정

[원료약품 및 그분량]

1정(200mg) 중

비피다스균(별규) 12mg (1.2×10^6 개)
락토민(별규) 6mg (6×10^5 개)

[성상] 흰색 또는 연한 담황갈색의 원형 나정

[효능·효과] 정장, 변비, 묽은 변, 복부 팽만감

[용법·용량]

1. 15세 이상 : 1일 3회, 1회 2정을 식사 후에 복용한다.
2. 5~14세 : 1일 3회, 1회 1정을 식사 후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 5세 미만의 소아
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 1) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
 - 2) 이 약을 투여하는 중에 묽은 변, 설사의 증상이 지속 또는 중증을 나타내는 경우

4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것
- 2) 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것

5. 저장상의 주의사항

- 1) 습기 등의 영향으로 품질이 변할 수 있으므로, 직사광선이 닿지 않고 습기가 적으며 서늘한 곳에 복용 시 뚜껑을 잘 닫아 보관하고 젖은 손으로 만지지 말 것
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
- 4) 사용 기한이 지난 제품은 복용하지 말 것
- 5) 한번 개봉한 후에는 품질 유지 측면에서 용법 용량대로 가능한 빨리 복용할 것
- 6) 정제에 미소한 반점이 보일 수 있는데, 이는 성분에 의한 것으로 품질에는 문제가 없음

[저장방법] 차광기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 240정

※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회 소비자분쟁 해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

민약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식약청 의약품사이트(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실 ☎080-777-5678: 수신자 요금 부담로 문의하십시오.

설명서 최종 개정 연월일 : 2012. 11. 16

제조사: WAKAMOTO Pharmaceutical Co., Ltd.
2-1-6, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

수입판매자:

동국제약 Dongkook
Pharmaceutical Co., Ltd.

서울시 강남구 테헤란로 108길 7 동국빌딩