

Daewon

일반의약품  
조제용  
분류번호 114 제형: 진동·소름제

# 카페드린에스 정

300정



대원제약주식회사

- ▶ 성분·화합: 이 약 1정 중  
카페드린염산염(KP)..... 12.5mg  
카페인무수물(KP)..... 50.0mg  
아세트아미노산(KP)..... 200.0mg  
이 약은 동물유래성분으로서 강한 향의 유에서 채취한  
유당수화물을 사용합니다.
- ▶ 성상: 흰색의 장방형의 정제
- ▶ 효능·효과: 감기의 증상상(인후통, 기침, 가래, 오한,  
발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화
- ▶ 용법·용량: 성인 1회 1정, 1일 3회 식후 30분에 복용  
합니다.
- ▶ 사용상의 주의사항: 첨부문서(라벨 뒷면 설명서) 참조
- ▶ 저장방법: 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

7 제제타이언  
**Daewon** 대원제약  
본사: 서울특별시 성동구 천호대로 386  
공정: 경기도 화성시 제1공단 1길 24

대원제약은 1981년 12월 24일 설립된 제약회사로, 현재는 100% 국내자본으로 운영되고 있습니다. 본사는 서울특별시 성동구 천호대로 386에 위치하고 있으며, 경기도 화성시 제1공단 1길 24에 공정을 운영하고 있습니다. 대원제약은 국내외에서 다양한 의약품과 의료기기를 생산하고 있으며, 국내외 시장에서의 경쟁력을 높이기 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 대원제약의 주요 제품으로는 카페드린에스, 카페드린에스 정, 카페드린에스 시럽 등이 있습니다. 대원제약은 고객에게 안전하고 효과적인 의약품과 의료기기를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

010-8806718-2035327

Recycle  
**HDPE**  
무연LDPE

## 사용상의 주의사항

- 경고 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기와 복통 시 전신을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만가렛 미만의 영아 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 5) 이 약을 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), 락프 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것, 잔해가며, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항산화제(비타민)를 함유하는 내복약(비타민) 경구제, 말미약, 알레르기(항알)

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것, 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 병이 및 만 15세 미만의 어린이(레이나나 구토)를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이지후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의 할 것 2) 만 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 약을 복용시키지 않도록 합니다. 3) 2세 미만 영아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알려주고 기온의 증가 모니터링을 합니다. 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 4) 지름파지 약에 의해 알레르기 증상에, 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람 5) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장질환 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장장애가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨, 통풍, 관절염, 항응고제)

- 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람: 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 개개가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것, 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우: 발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종, 어지러움, 불안, 떨림, 불면 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상 증상이 나타난 경우 ① 속(아니발락시): 복용후 바로 두드러기, 부종, 가슴 답답함 등과 함께 양안에 청백색, 소변이 차고, 식욕, 소화기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다. ② 피부정맥관중증후군(레이브스-존슨 증후군), 중증스테로이드사용후(레이브스-존슨) : 고열을 동반하고, 발진·발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈주머니에 나타날 수 있습니다. ③ 천식 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)이 나타날 수 있습니다. ⑤ 간질성폐렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타날 수 있습니다.

- 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 장기간 계속 복용하지 말 것 3) 복용시에는 음식물과 잘 갈 것 4) 바로바로 약을, 삼켜서 복용할 것 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노산을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노산의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다.
- 정장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것, 2) 적사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기나 적은 서늘한 곳에 보관할 것, 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

- ▶ 저장방법: 기밀용기, 실온보관(1~30℃)
- ▶ 사용기한: 외부포장참조
- ▶ 포장단위: 자사포장단위

**카페드린에스 정**  
300정  
대원제약주식회사

일반의약품  
조제용  
분류번호 114 제형: 진동·소름제