

하이벨라씨정

기미 · 주근깨 · 피부염 · 욕체미로
L-시스테인(아미노산), 비타민C 함유

Highbella C Tab.

일반의약품 분류번호: 319(기타의 비타민제)

[원료약품 및 그분량] 1정 중

L-시스테인(JP)	60.0mg
아스코르브산 97% 과립(별규)	257.73mg(아스코르브산으로서 250mg)
판토텐산칼슘(KP)	12.0mg
토코페롤아세테이트2배산(KP)	100.0mg(비타민 E로서 50IU)
피리독신염산염(KP)	3.0mg
리보플라빈(KP)	6.0mg
γ-오리자놀(KP)	10.0mg

* 첨가제(동물유래성분): 유당(젖당)수화물(소, 우유)

[성 상] 진주빛을 띤 흰색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]

■ 다음 경우의 비타민 E, B₂, B₆, C의 보급

- 욕체 피로 · 임신·수유기 · 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시 · 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 햇빛, 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화 · 말초혈행장애 및 냉경기 시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족 저림, 수족냉증(손발이 차가움) · 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 · 잇몸출혈, 비출혈(코피) 예방

[용법·용량] 성인 및 만 12세 이상: 1일 2회 / 만 8세 이상 ~ 만 12세 미만: 1일 1회, 1회 1정씩 복용한다.

※ 사용상의 주의사항



1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (2) 만 3개월 미만의 영아
- (3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.



2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 레보도파



3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)



- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 (4) 동통 환자 또는 신장결석에 있는 환자



4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - ① 비타민 E 함유 제제: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) ② 비타민 C 함유 제제: 구역, 구토, 설사
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리기 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- (5) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경 병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
- (6) 우발적으로 과량 복용한 경우
- (7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우



5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여할 것
- (3) 각종 요양사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. (4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.



6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- (3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 60정, 180정 [저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상해드립니다.

※ 본 제품은 영아(갓난아기) 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 본 제품을 삼켜서 복용할 시 정제기 가도에 걸릴 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

※ 본 첨부문서의 내용은 최신 정보 및 허가 정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 콜로버서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.

[소비자상담실] ☎080-024-0030(수신자부담 콜로버서비스) [제조자] 광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114

[작성일자] 2016. 05. 23