

우수한 근육이완 · 빠른 진통효과

일반의약품

분류번호:114

카바몰에스정

카바몰에스정은 골격근 이완작용, 항경련작용이 있는 클로르족사존과 진통작용이 있는 아세트아미노펜의 복합제로서, 근육의 경련성 질환, 격심한 운동에 따른 근골격계의 심한 통증 및 수축과 이완을 경감시키고 근육의 긴장을 해소하는 효과를 나타냅니다.

【성분 · 함량】 (1정 중)

아세트아미노펜(KP) 300mg

클로르족사존(USP) 250mg

첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호

【성 상】 등황색(주황색)의 장방형 정제

【효능 · 효과】

신경통, 근육통, 관절통, 요통(허리통증), 염좌통(뻥 통증), 건통(어깨결림, 어깨통증), 근경련(근육경련), 근경직(근육경직)등 근육의 이상 긴장을 수반하는 제 질환(여러 증상)

【용법 · 용량】

성인 : 1회2정, 1일4회까지 공복시(빈속)을 피하여 복용(투여)합니다.

※ 연령(나이), 증상에 따라 적절한 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 클로르족사존에 과민증 환자
- 2) 아세트아미노펜에 과민증 환자
- 3) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
- 5) 이 약은 유당수화물(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 심한 간, 신장에(신장(콩팥)장애) 환자
- 2) 알레르기 환자 또는 약물 알레르기가 있었던 환자
- 3) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

4. 부작용

- 1) 과민증 : 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투여를 중지합니다. 드물게 알레르기성 피부발진, 점상출혈(출혈점), 반상출혈(피부에 검보라빛 얼룩점이 생기는 내부 출혈), 요변색(소변색이 변함) 등이 나타날 수 있습니다. 매우 드물게 혈관신경성 부종(부기) 또는 아나필락시스증상이 나타날 수 있습니다.

- 2) 간장 : 클로르족사존에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타나면 투여를 중지합니다.
- 3) 소화기 : 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있습니다.
- 4) 청신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있습니다.

5. 복용 시 주의사항

- 1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담 하십시오.
 - 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등) 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - 교열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - 천식이 나타난 경우
- 2) 바르비탈계 약물, 심한게 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
- 3) 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 마십시오.
 - 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있습니다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 됩니다.

6. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우 투여합니다.

7. 상호작용

알코올이나 중추신경억제제와 병용(함께복용)투여시 상가작용이 나타나므로 신중히 투여합니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관 하십시오.
- 3) 오염(질못사용)을 막고 품질을 보존하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.


【저장방법 및 사용기한】 밀폐용기, 상온보관(15~25℃), 외부용기 표기

【포장단위】 자사포장단위 (외부용기 표기)

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
 ※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.siniipharm.com

※ 이 제품은 안전용기 제품입니다. 아래의 그림과 같이 강하게 눌러 개봉해주시시오.



코스닥상장
신일제약(주)

충청북도 충주시 양성면 복상골길 28



설명서 작성년월일 : 2015.01.08