

Peripherally acting antitussives

전문의약품

분류번호:222

레바틴 정 (Levodropropizine)

원료약품 및 그 분량: 1정 중

레보드로프로피진(EP) 60mg

동물유래성분: 유당수화물(건강한 소의 우유)

성상: 흰색 원형 정제

효능·효과

다음 질환에서의 기침: 급·만성기관지염

용법·용량

성인: 레보드로프로피진으로서 1회 60 mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다.

증상에 따라 적절히 증감한다

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
- 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 중증의 간장애 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
- 2) 고령자
- 3) 만 2세 미만의 영아

3. 이상반응

- 1) 소화기계: 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계: 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
- 3) 순환기계: 심계항진
- 4) 피부: 매우 드물게 알레르기 반응

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있다.

5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

저장방법: 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위: 자사포장단위

※ 이 첨부문서 최초 작성일자(2012년 07월 09일)이후 변경된 내용은

(<http://www.miraepharm.com>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자피해보상규정" 의거 소비자 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

제 조 자: **KGMP적격업체** **위더스제약(주)**
WITHUS WITHUS PHARMACEUTICAL CO., LTD.

경기도 안성시 미양면 제2공단 2길 103
www.withuspharm.com

제 조 의뢰자: **MR** **미래제약주식회사**
MIRAE MIRAE PHARM KOREA CO., LTD.

본사: 서울시 서초구 서초동 1337 세인트미래빌딩 7층
공장: 경기도 안성시 신소현동 137