GMP KGMP

효과 빠른 액상형 진통소염제

일반의약품
분류번호 : 114

# 나쎈 연질캡슐

## (나프록센)

**【성분 · 함량】** (1캡슐 중)

나프록센(KP) ..... 250mg

청개제(타르색소) : 청색1호, 황색203호

**【성 상】** 미황 내지 연한 녹색의 내용물을 함유한 녹색 투명의 장방형 연질캡슐제

**【특 징】**

1. 나쎈연질캡슐은 비스테로이드성인 프로피온산의 유도체로서 우수한 소염(항염)진통제 입니다.
2. 나쎈연질캡슐은 스테로이드제제와는 달리 심출혈(천식, 고혈) 억제작용으로 항염효과를 나타냈이 임상설과에서도 되었습니다.
3. 스테로이드제제는 부작용이 많아 사용상 제한이 많고 소염(항염)효소제는 정상반응성 염증 중 특히 초기에만 유효함에 반해 나쎈연질캡슐은 여러 가지 원인에 의한 급 · 만성 염증에 있어 신행상태에 관계없이 치료효과를 나타냅니다.
4. 나쎈연질캡슐은 소염(항염)효과외에 진통 · 해열작용도 있어 별도로 해열 · 진통제를 추가 투여해야할 필요가 없습니다.
5. 나쎈연질캡슐은 스테로이드제제와는 달리 일반 소염제(항염증제,염증약)에 비해서 내약성(약에 대한 내성)이 오수하여 스테로이드제제나 소염(항염)효소제와는 달리 만성염증성질환에도 사용할 수 있는 이점이 있습니다.
6. 나쎈연질캡슐은 액상형 연질캡슐로 신속히 체내에 흡수되어 약효과가 빠르게 나타나며 위장관장애가 적습니다.

**【효능 · 효과】**

1. 주 효능 · 효과 : 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염, 건염(힘줄염), 급성 통풍, 월경곤란증
2. 다음 질환에도 사용할 수 있습니다. : 편두통, 발치(이를 뽑음)후 동통(통증), 수술 후 동통(통증), 월맥(윤활)낭염, 골결근(근육) 장애(염좌(삠), 좌상(타박상,멍), 외상(상처), 요천통(허리통증)).

**【용법 · 용량】**

1. 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염
   성인 : 나프록센으로서 1회 250~500mg(1~2캡슐), 1일 2회(12시간마다) 경구투여(복용)합니다.
2. 급성통풍
   성인 : 나프록센으로서 초회량(처음 복용량)으로 750mg(3캡슐)을 복용하고 발작이 소실(없어짐)될 때까지 8시간 간격으로 250mg (1캡슐)을 경구투여(복용)합니다.
3. 골격근(근육)장애, 수술후 동통(통증), 발치(이를 뽑음)후 동통(통증), 월경곤란증, 건염 (힘줄염), 월맥(윤활)낭염
   성인 : 나프록센으로서 초회량(처음 복용량)으로 500mg(2캡슐)을 경구투여(복용)한 후 6~8시간 간격으로 250mg(1캡슐)씩 투여(복용)합니다. 1일 총 용량이 1,250mg(6캡슐)을 초과하지 않도록 합니다.
4. 편두통
   성인 : 나프록센으로서 초회량(처음 복용량)으로 750mg(3캡슐)을 경구 투여(복용)합니다.필요하면 1일 250~500mg(1~2캡슐)을 더 투여(복용)할 수 있으며 초회량(처음 복용량)의 투여(복용) 30분후에 투여(복용)합니다. 1일 총 용량이 1,250mg(6캡슐)을 초과하지 않도록 합니다. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감합니다.

**【사용상의 주의사항】**

1. 경고
   1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.
   2) 심혈관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제는 중대한 심혈관계 혈전(혈관막힘) 반응, 심근경색증 및 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있습니다. 투여 기간에 따라 이러한 위험이 증가할 수 있습니다. 심혈관계 질환 또는 심혈관계 질환의 위험인자가 있는 환자에서는 더 위험할 수도 있습니다. 의사와 상의하는 이러한 심혈관계 증상의 발현(드러냄,드러내 보임)에 대하여 신속히 모니터링하여야 하며, 이는 심혈관계 질환의 병력이 있는 경우이는 마찬가지로 적용됩니다. 환자는 중대한 심혈관계 독성의 징후 및/또는 증상 및 이러한 증상이 발현(드러냄, 드러내 보임)되는 경우 취할 조치에 대하여 사전에 알고 있어야 합니다.
   3) 위장관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제는 위 또는 장관(창자)의 출혈, 궤양 및 천공(뚫림)을 포함한 중대한 위장관계 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있습니다. 이러한 이상반응은 투여 기간 동안에 경고 증상 없이 발생할수 있습니다. 고령자(노인)는 중대한 위장관계 이상반응의 위험이 더 클 수 있습니다. 투여 기간이 길어질수록 중대한 위장관계 이상반응의 발생 가능성이 증가할 수 있으니 단기 투여시 이러한 위험이 완전히 배제되는 것은 아닙니다. 이 약을 투여하는 동안 위장관계 궤양 또는 출혈의 증상 및 징후에 대하여 신중히 모니터링 하여야 하며, 중증(심한 증상)의 위장관계 이상반응이 의심되는 경우 즉시 추가적인 평가 및 치료를 실시하여야 합니다. 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 중증(심한 증상)의 위장관계 이상반응이 완전히 배제될 때까지 투여 중단하는 것도 치료법이 될 수 있습니다.
   고위험군의 환자에게는 비스테로이드성 소염(항염)진통제와 관련 없는 다른 대체 치료제를 고려하여야 합니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 소화성궤양 환자 2) 심한 혈액이상 환자 3) 심한 간장애 환자 4) 심한 심기능부전 환자 5) 심한 신장애(신장장애) 환자
   6) 심한 고혈압 환자 7) 이 약의 성분 또는 아스피린 등 비스테로이드성 소염(항염)진통제에 과민증이 있는 환자
   8) 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염(항염)진통제(COX-2 저해제외역제제) 포함)에 의하여 천식, 비염(코염), 코의 용종, 두드러기, 알레르기 반응 또는 그 병력이 있는 환자(이러한 환자에서 비스테로이드성 소염(항염)진통제 투여 후 치명적인 중증(심한 증상)의 아나필락시양 반응이 드물게 보고되었습니다.)
   9) 관상동맥(심장동맥) 우회로술(CABG) 전후에 발생하는 통증의 치료
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 소화성궤양의 병력이 있는 환자 2) 혈액이상 또는 그의 병력이 있는 환자
   3) 출혈경향이 있는 환자 (혈소판 기능저하가 나타날 수 있습니다.) 4) 간장애 또는 그의 병력이 있는 환자
   5) 신장애(신장장애) 또는 그의 병력이 있는 환자 및 신(콩)혈류량이 저하된 환자 6) 심기능 장애 환자
   7) 고혈압 환자 8) 과민증의 병력이 있는 환자 9) 기관지천식 환자
   10) 전신성홍반낭(붉은 반점)성루푸스(SLE) 환자 및 혼합결합조직질환(MCTD) 환자 11) 고령자(노인)
4. 이상반응
   1) 과민증 : 드물게 측증상(호흡곤란, 혈압강하, 서맥(느린맥), 식은땀, 부종(부기) 등), PIE증후군(호산구증가를 수반하는 폐침윤 : 발열, 천명(숨을 쌕쌕거림), 기침, 가래를 동반함), 두드러기, 때때로 발진, 가려움 등의 과민증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.
   2) 소화기계 : 드물게 토혈(혈액구토), 위장출혈, 소화성궤양, 천공(뚫림)이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오. 때때로 위부불쾌감, 위통, 복통(배아픔), 구역, 구토, 식욕부진, 소화불량, 가슴쓰림, 설사, 변비, 구내염(입안염) 드물게 복부(배부분)팽만감, 흑변(검게 변함), 구갈(입이 마름) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
   3) 혈액 : 드물게 무과립구증, 혈소판증다, 백혈구감소, 혈소판감소, 재생불량성빈혈, 용혈성빈혈, 혈소판 기능저하(출혈시간의 연장)등의 혈액장애가 나타날 수 있으므로 혈액검사를 하는 등 관찰을 충분히 하고 이상이 있는 경우에는 투여를 중지하십시오.
   4) 간장 : 드물게 GOT, GPT치의 상승, 황달, 간염이 나타날 수 있습니다.
   5) 신장(콩팥) : 드물게 신장애(신장장애), 사구체 신염(신장염), 혈뇨, 고칼륨 혈증, 간질성 신염(신장염), 신(콩팥)증후군, 신장(콩팥) 유두괴사, 단백뇨(단백질이 섞인 오줌), 신(콩팥)부전이 나타날 수 있습니다.
   6) 정신신경계 : 드물게 무균성 수막염이 보고되어 있으므로 심한 두통, 구역, 구토, 불면, 목이 뻣뻣함, 발열 또는 의식장애 등의 증상이 나타날 수도 투여를 중단하고 의사와 상의하며, 특히 자가면역질환(SLE, MCTD)환자에게는 신중히 투여하십시오. 또한 때때로 졸음, 인식기능장애 드물게 현기(어지러움), 두통, 수축저항, 정력감퇴, 피로, 우울, 비정상적인 꿈, 집중능력 상실, 지남력 상실(방향감각상실), 불면, 근육통, 근(근육)쇠약이 나타날 수 있습니다.
   7) 피부 : 때때로 습진, 발한(땀이 남), 자반(자주색 반점) 드물게 광과민증, 탈모, 발적(충혈되어 붉어짐), 과사성홍해, 다형성홍반(여러모양의 붉은 반점), 스티븐스-존슨증후군(피부점막안증후군), 두드러기, 표피 수포증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 있는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 조치를 하십시오.
   8) 감각기계 : 이명(귀울림), 청각장애 시각장애가 나타날 수 있습니다.
   9) 기타 : 때때로 부종(부기), 흐름곤란, 드물게 심계항진(두근거림), 근무력증(근육무력증), 울혈성심부전, 호산구성 폐렴, 아나필락시양 반응, 혈경상에, 오한(춥고 떨리는 증상)과 발열, 맥관염(혈관염), 고혈당, 저혈당이 나타날 수 있습니다.
5. 일반적주의
   1) 이 약을 투여하기 전에 이 약 및 다른 대체 치료법의 잠재적인 위험성과 유익성을 고려해야 합니다. 이 약은 각 환자의 치료 목적과 일치하도록 가능한 최단 기간동안 최소 유효량으로 투여하십시오.
   2) 소염(항염)진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)임에 유의하십시오.
   3) 만성질환(만성관절류마티증, 변형성 관절증 등)에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려하십시오.
      ① 이 약을 장기간 투여하는 환자는 정기적으로 약상검사(노검사, 전혈구 검사(CBC) 및 이화학적 검사 등 혈액 검사, 간기능 검사, 안과 검사등)를 실시하고 이상이 있을 경우 감량(줄임), 휴약(복용중지) 등의 적절한 조치를 하십시오. 간질환 또는 신(콩팥)질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후(예: 호산구증가증, 발진)가 발현(드러냄,드러내 보임)되거나 비정상적인 간기능 검사 또는 신(콩팥)기능 검사 결과가 지속되거나 악화되면, 이 약의 투여를 중단해야 합니다.
      ② 약물요법 이외의 치료법도 고려하십시오.
   4) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려하십시오.
      ① 급성증속, 동통(통증) 및 발열의 정도를 고려하여 투여하십시오. ② 원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피하십시오.
      ③ 원인요법이 있으면 그것을 실시하십시오.
   5) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 이상반응의 발현(드러냄,드러내 보임)에 유의하십시오. 과도한 체온강하, 허탈, 사지(팔다리) 냉각 등이 나타날 수 있으므로 특히 고열을 수반하는 소아 및 고령자(노인)는 소모성 질환 환자에게는 투여 후 환자의 상태에 충분히 주의하십시오. 하약자에게는 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 이상반응의 발현(드러냄,드러내 보임)에 특히 유의하십시오.
   6) 이 약의 억리학적 특성상 염증의 다른 증상과 징후를 불현성화(같으로 드러나지 않게)하여 통증성 및 비감염성 조건하에서 감염성 합병증의 진단을 지연시킬 수 있습니다. 이 약을 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 직절한 항균제를 병용(함께 복용)하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여하십시오.
   7) 위장관계 이상반응 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 궤양성 질환 또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자에게 처방시 극심한 주의를 기울여야 합니다. 소화성 궤양 질환 및/또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자의 경우 이러한 위험인자가 없는 환자에 비해 비스테로이드성 소염(항염)진통제 투여시 위장관 출혈의 발생 위험이 10배 이상 증가하였습니다. 위장관계 출혈을 증가시키는 다른 위험인자로는 경구용(복용중) 코르티코스테로이드 또는 항응고제 병용(함께 복용), 비스테로이드성 소염(항염)진통제의 장기 사용 알콜섭취, 고령, 허약한 건강상태 등이 있습니다. 치명적인 위장관계 이상반응에 대한 지날적 보고의 대부분은 고령자(노인)및 허약자에 대한것이므로, 이러한 환자에게 이 약을 투여시 특별히 주의하여야 합니다.
   8) 고혈압 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제는 고혈압을 일으키거나, 기존의 고혈압을 악화시킬 수 있으며, 이로 인해 심혈관계 유해사례의 발생률이 증가될 수도 있습니다. 티아지드계 이뇨제 또는 루프형 이뇨제를 복용중인 환자가 비스테로이드성 소염(항염)진통제 복용시 이들 요법에 대한 반응이 감소될 수 있습니다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제는 고혈압 환자에서 신중히 투여해야 합니다. 이 약의 투여 초기와 투여기간 동안에 혈압을 면밀히 모니터링해야 합니다.
   9) 울혈성심부전 및 부종(부기) : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 복용하는 일부 환자이서 체액 저류(고임) 및 부종(부기)발초적인 보충(투여)이 관찰되었습니다. 이 약은 체액 저류(고임) 또는 심기능 부전 환자에는 신중히 투여하십시오.
   10) 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 장기간 복용시 신장(콩팥)유두괴사나 기타 신장(콩팥) 손상이 일어날 수 있습니다. 다만, 신(콩팥)혈류량 유지하는데 프로스타글란딘의 역할이 중요하므로, 심부전 환자, 신(콩팥)기능 부전 환자, 간기능 부전(간기능 상실) 환자, 이뇨제나 ACE 저해제(역제제)를 투여 중인 환자, 고령자(노인) 등에서는 특별한 주의가 필요합니다. 투약을 중단하면 대부분 치료 전 상태로 회복됩니다.
   11) 신행된 신(콩팥)질환 : 신행된 신(콩팥)질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없습니다. 따라서 신행된 신(콩팥)질환 환자에 대해서는 이 약의 투여가 권장되지 않습니다. 이 약의 투여를 고려해야 한다면, 환자의 신상(콩팥) 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 합니다.
   12) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제의 투여로 간기능 수치의 상승이 나타날 수 있습니다. 이러한 복합 증상은 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염(항염)진통제 투여 후 비슷(유사)한 양상으로 나타날 수도 있습니다. 이러한 복합 증상은 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염(항염)진통제 투여 후 비슷(유사)한 양상으로 나타날 수도 있습니다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제 투여로, 혈청 지연적 간염(급격히 발병하는 간염), 간괴사, 간부전(간기능상실) 환자, 이뇨제나 ACE 저해제(역제제)를 투여 중인 환자, 고령자(노인) 등에서는 특별한 주의가 필요합니다. 투약을 중단하면 대부분 치료 전 상태로 회복됩니다.
   13) 혈액학적 변화 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 복용하는 일부 환자이서 체액 저류(고임) 및 부종(부기)발초적인 보충(투여)이 관찰되었습니다. 이 약은 체액 저류(고임) 또는 심기능 부전 환자에는 신중히 투여하십시오.
   14) 간장애 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제로 장기간 치료 중 간기능 수치의 상승이 나타날 수 있습니다. 이러한 복합 증상은 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염(항염)진통제 투여 후 비슷(유사)한 양상으로 나타날 수도 있습니다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제 투여로, 혈청 지연적 간염(급격히 발병하는 간염), 간괴사, 간부전(간기능상실) 환자, 이뇨제나 ACE 저해제(역제제)를 투여 중인 환자, 고령자(노인) 등에서는 특별한 주의가 필요합니다. 투약을 중단하면 대부분 치료 전 상태로 회복됩니다.
   15) 혈액학적 변화 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제는 혈소판 기능저하(출혈시간의 연장)등 혈액학적 변화를 일으킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있습니다. 이들 증상은 이상반응은 같은 증상 없이 발생할 수 있습니다. 대부분의 경우 이 약을 투여 초기 1개월 이내에 발생합니다. 환자는 중대한 피부 발현(드러냄, 드러내보임) 증상 및 증후에 대해 알고 있어야 하며 피부 발진 또는 다른 과민반응의 최초 증상 및 징후가 나타날 때 약을 투여를 중단해야 합니다.
   16) 천식 환자 중 일부는 아스피린에 민감하게 반응할 수 있습니다. 아스피린 민감성 천식 환자에게 아스피린을 사용하는 경우 치명적일 수 있는 증증(심한 증상)의 기관지경련과 관련될 수 있습니다. 이러한 아스피린 민감성 환자에게서 아스피린과 다른 비스테로이드성 소염(항염)진통제 간의 기관지경련을 포함하는 교차반응이 보고되었습니다. 그러므로 이 약은 이러한 아스피린 민감성 환자에게는 투여하지 않도록 하며, 천식 환자에게는 주의깊게 사용하여야 합니다.
   17) 이 약은 코르티코이드 제제를 대체하거나 코르티코이드 결핍증을 치료하기 위한 약물로 사용될 수 없습니다. 코르티코스테로이드의 갑작스러운 투여 중단은 코르티코스테로이드-반응성 질환의 악화를 초래할 수 있습니다. 장기간 코르티코스테로이드를 복용해 온 환자에게 이 약을 투여하고자 할 경우에는 서서히 용량을 감소시켜야 합니다.
6. 상호작용
   1) 다른 비스테로이드성 소염(항염)진통제(NSAIDs) 및 나프록센 유도체와 병용(함께 복용)할 경우 이상반응의 위험이 증가할 수 있으므로 병용(함께 복용)하지 않습니다.
   2) 헤다몬인계 항간질제, 설파제, 설포닐요소계 혈당강하제 : 이러한 약물과 병용투여(함께 복용)시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 충분히 관찰하고 신중히 투여하십시오.
   3) 프로프리놀롤 및 다른 β -차단제 : 이 약과의 병용투여(함께 복용)로 인해 항고혈압 효과가 감소될 수 있습니다.
   4) ACE 저해제(역제제)(캡토프릴 등)
      ① 비스테로이드성 소염(항염)진통제에 의해 ACE 저해제(역제제)의 항고혈압효과가 감소될 수 있다는 보고가 있으므로 이 약과 ACE 저해제(역제제)를 병용투여(함께 복용)하는 경우 이러한 상호작용을 염두에 두어야 합니다.
      ② ACE저해제(억제제)(캡토프릴)와 병용(함께 복용)에 의해, 신장애(신장장애)을 일으킬 수 있으므로, 병용(함께 복용)하는 경우에는 신중히 투여하십시오.
   5) 루프계 이뇨제 및 티아지드계 이뇨제
      ① 임상시험 및 시판 후 조사 결과 이 약의 신(콩팥)에서의 프로스티글란딘 합성 억제에 의해 일부 환자에서 푸로세미드 및 티아지드계 이뇨제의 이뇨제의 나트륨뇨배설 효과가 감소할 수 있음이 확인되었습니다. 이들 약물과 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 병용투여(함께 복용)하는 동안 신(콩팥)부전 징후를 면밀히 관찰해야 합니다.
      ② 이 약은 루프계 이뇨제(푸로세미드, 피레타니드) 및 티아지드계 이뇨제의 작용을 감소시킬 수 있으므로 병용투여(함께 복용)하는 경우에는 신중히 투여하십시오.
   6) 프로베네시드 : 병용투여(함께 복용)시 이 약의 혈중농도가 상승하여 혈중 반감기가 연장되므로 감량(줄임)하는 등 신중히 투여하십시오.
   7) 아스피린 : 아스피린과의 병용(함께 복용)이 비스테로이드성 소염(항염)진통제의 사용과 관련된 증대한 심혈관계 혈전반응의 위험을 감소시킬 수 있다는 일관된 증거는 없습니다. 다른 비스테로이드성 소염(항염)진통제와 마찬가지로 이 약과 아스피린의 병용(함께 복용)에 의해 중증(심한 증상)의 위장관계 이상반응의 발생률이 증가될 수 있으므로 두 약물의 병용(함께 복용)은 일반적으로 권장되지 않습니다.
   8) 리튬 : 비스테로이드성 소염(항염)진통제는 신장(콩팥)에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 혈청 리튬의 농도를 증가시키고 리튬의 신(콩팥)클리어런스를 감소시킬 수 있습니다. 비스테로이드성 소염(항염)진통제와 리튬의 병용 투여(함께 복용)시 리튬중독을 일으킬수 있으므로, 병용(함께 복용)하는 경우 리튬의 독성 징후를 주의깊게 관찰하고 감량(줄임)하는 등 신중히 투여해야 합니다.
   9) 메토트렉세이트 : 비스테로이드성 소염(항염)진통제(NSAIDs)와의 병용투여(함께 복용)로 신세뇨관(신장세뇨관)에서 메토트렉세이트의 배설이 지연되어 치명적인 메토트렉세이트의 혈액학적 독성이 증가될 수 있으므로 항암요법으로 사용하는 고용량의 메토트렉세이트와는 병용투여(함께 복용)하지 않으며, 저용량의 메토트렉세이트와 병용투여(함께 복용)시 신중히 투여되어야 합니다.
   10) 쿠마린계 항응혈제(와르파린 등)
      ① 위장관계 출혈에 대하여 와르파린과 비스테로이드성 소염(항염)진통제는 상승작용을 나타낼 수 있으므로 두 약물을 함께 사용하는 환자는 민독으로 투여하는 경우에 비해 중증(심한 증상)의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있습니다.
      ② 쿠마린계 항응혈제와 병용투여(함께 복용)시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 충분히 관찰하고 신중히 투여하십시오.
   11) 지도부딘 : 이 약은 지도부딘의 대사를 억제하고 혈중농도를 상승시킬 수 있으므로, 병용(함께 복용)하는 경우에는 감량(줄임)하는 등 신중히 투여하십시오.
   12) 뉴퀴놀론계 항생물질(에녹사신수화물 등) : 이 약과 병용(함께 복용)에 의해 경련을 일으킬 수 있으므로 신중히 투여하십시오.
7. 임부에 대한 투여
   1) 이 약을 임부에게 투여한 임상지료가 없습니다. 동물실험에서 주산기(출산전후기)에 투여하여 분만지연, 난산의 발생 빈도 증가 및 새끼의 생존율 감소가 보고되어 있으므로 임신부(임산부)에는 이 약을 투여하지 않습니다.
   2) 임신말기의 랫트의 투여한 실험에서 태자의 동맥관수축이 보고된 바 있습니다. 다른 비스테로이드성 소염(항염)진통제와 마찬가지로 이 약은 투여 시 태아의 동맥관을 조기 폐쇄시킬 수 있으므로 이 약은 양부에게 투여를 피해야 합니다.
   3) 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임산하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돎, 웃돌다)한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
8. 수유부에 대한 투여
   이 약은 모유로의 이행이 일어나 신생아에서 프로스타글란딘 합성을 억제하는 이상반응을 일으키므로 수유부에는 투여하지 않습니다.
9. 소아에 대한 투여
   1) 2세 이하의 영아(젖먹이,갓난아기)에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
   2) 소아에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 이상반응의 발현(드러냄, 드러내보임)에 특히 유의하십시오.
10. 고령자(노인)에 대한 투여 : 일반적으로 고령자(노인)는 소염(항염)진통제에 의한 소화관의 궤양, 출혈 등의 발현(드러냄, 드러내보임)이 높으므로 소량부터 투여를 시작하여 필요한 최소량으로 투여하고 이상반응의 발현(드러냄,드러내보임)에 특히 유의하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여 하십시오.
11. 임상검사치에 대한 영향
   1) 17-케토제닉 스테로이드의 측정에 영향을 주므로 측정 72시간 전에 이 약의 투여를 중지하십시오.
   2) 혈소판의 응집을 억제하고 출혈시간을 연장시킬 수 있으므로 출혈시간을 측정할 때는 주의하십시오.
12. 과량투여시의 처치 : 과량투여시 졸음, 가슴쓰림, 소화불량, 구역, 구토가 나타나며 이러한 경우에는 위세척을 하고 활성탄을 사용하여 혈장농도를 줄여야 합니다.
13. 보관 및 취급상의 주의사항
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 비람직하자 않으므로 이를 주의하십시오.

**【포장단위】** 자시모장단위 (외부용기 표기)

**【저장방법 및 사용기간】** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관. 제조일로부터 2년

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래 위원회고시 "소비자 분쟁 해결 기준" 에 의거 소비자의 징당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

**■제품문의** (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

제조의력자
신일제약(주)
충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28

제조자
서흥캅셀(주)
경기도 부천시 소사구 송내대로 14

설명서 개정년월일 : 2013.03.27