

말초·뇌혈행장에 치료제

나프닐 정 (나프로닐옥살산염)

■원료약품의 분량 1정 중

나프로닐옥살산염(KPC) 100mg

■성상 흰색의 원형 필름코팅정제

■효능·효과

1. 뇌혈행 및 뇌영양장애에 의한 증상
2. 말초, 내이, 눈의 망막·맥락막 혈행 및 영양장애

■용법·용량

성인 : 나프로닐옥살산염으로서 1회 100mg 1일 3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 급성 심근경색 환자
- 2) 출혈성 상해 초기 환자
- 3) 기립성 조절장애 환자
- 4) 이 약에 과민증 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

중증의 신부전 환자

3. 이상반응

- 1) 정신신경계 : 때때로 불안, 졸음, 불면, 드물게 피로감, 두통, 어지러움 등이 나타날 수 있다.
- 2) 소화기계 : 때때로 구역, 위통, 설사 등이 나타날 수 있다.
- 3) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있다.
- 4) 간장 : 간염이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료의 목적으로는 사용하지 않는다.

5. 상호작용

혈압강화제와 병용투여시 혈압강화작용이 증강될 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

- 2) 모유중으로의 이행이 보고되었으므로 수유중에는 투여하지 않는다.

7. 과량투여시의 처치

과량투여에 의해 심전도억제 및 경련이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 위세척을 하고, 필요에 따라 활성탄을 사용한다. 심혈관기능과 호흡을 모니터링하며, 심한 경우 전기심박조율기를 사용하거나 이소프레날린을 투여한다. 경련의 경우 디아제팜을 투여한다.

■포장단위 자사포장단위

■저장방법 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지(www.ejrp.co.kr)를 통해서 확인하실 수 있습니다. 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염 및 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다. 본 제품이 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이진드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>→정보마당→의약품등정보)를 참조하세요.

소비자상담전화 : 080-353-6500 (수신자부담)

최초작성연월일 2013. 07. 19

JRP | 주 | 제이알피

경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 34-40