

분류번호 : 316(혼합비타민제(비타민AD 혼합제제를 제외)) 일반의약품

비타민B,C,E+아연함유 종합영양제

비타민B,C,E+아연함유 종합영양제



· 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
· 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

[원료약품 및 분량] 1캡슐(1,645 mg) 중 주성분 :

티아민질산염(KP)비타민B1	15.00mg
리보플라빈(KP)비타민B2	7.50mg
판토텐산칼슘(KP)비타민B5	15.00mg
피리독신염산염(KP)비타민B6	10.00mg
폴산(KP)엽산	0.20mg
시아노코발라민1000배산(KP)(시아노코발라민으로서6 μ g)비타민B12	6.00mg
아스코르브산(KP)비타민C	300.00mg
토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 15 IU)	15.00mg
산화아연(KP)(아연으로서 20.08 mg)	25.00mg
콜린타르타르산염(DAB)	25.00mg
니코틴산아미드(KP)비타민B3	50.00mg
이노시톨(KP)	25.00mg

[성상] 황색의 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 E, B1, B2, B6, C의 보급
- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
·비타민B1(티아민질산염)
다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨 결림 등), 각기, 눈의 피로
·비타민B2(리보플라빈)
다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
·비타민C(아스코르브산)
햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈, 비출혈(코피) 예방

2. 아연의 보급

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

[사용상 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
(2) 만 12개월 미만의 젖먹이
(3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
(4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
(2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
(2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
(3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
(4) 심장·순환기계기능 장애 환자
(5) 신장(콩팥)장애 환자
(6) 저단백혈증 환자
(7) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
(8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
(2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
(3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
(4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
(5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
(6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μ g이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
(7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

- (8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- (10) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항
(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
(2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
(3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
(4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
(5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 6) 저장상의 주의사항
(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[문의전화] 본사 02)2021-9300

[소비자상담실] 080-023-1897(수신자요금부담)

[제조외뢰자]

동화약품(주) / 본사 : 서울특별시 중구 후암로 98, 19층 / 공장 : 충청북도 충주시 충주산단1로 167

[제조사] 알피코프(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7

· 본 의약품에 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

· 본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 02월 13일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.

