

STENA EVE

스테나 이브정

for Women

스테나 이브 정

STENA EVE Tab.

KGMP 일반의약품

분류번호: 316

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관 하십시오.

● 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

티아민질산염(KP)	15mg
리보플라빈(KP)	15mg
피리독산염산염(KP)	5mg
시아노코발라민(KP)	12μg
폴산(KP)	400μg
아스코르브산97%과립(아스코르브산으로서 600mg)(별규)	618.6mg
토코페롤아세테이트2배산(비타민E로서 30I.U.)(KPC)	60mg
비오틴(USP)	45μg
니코틴산아미드(USP)	100mg

● 성상 : 감색의 장방형 필름코팅정

● 효능 · 효과

다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, C, E의 보충

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하시
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 햇빛 · 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
 - 잇몸출혈 · 비출혈(코피) 예방

● 용법 · 용량

만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

● 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 3개월 미만의 젖먹이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 - 1) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 5) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

LEMONA

경남제약(주)
Kyung Nam Pharm. Co., Ltd.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

위부(상복부)불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 땀은 변

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈전 막힘성 소인)이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘증)의 위험이 증가될 수 있다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

5) 피라독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.

7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체적 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

8) 우발적으로 과량복용한 경우

9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것

3) 각종 요검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

● **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

● **포장단위** : 자사포장단위(외부포장에 표기)

● **제조판매자** : 경남제약(주) 충남 아산시 신창면 서부남로790번길 49

※ **기타주의**

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.

2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.

3. PTP포장을 개봉하여 복용 시 가품 정제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자상담실로 문의하시기 바랍니다.

※ 소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 “소비자 분쟁 해결기준”에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관 <http://drug.mfds.go.kr> → 「의약품 검색」을 참조하시기 바랍니다.