

피피다운 연질캡슐

원료약품의 분량 필수인지질성분 600mg
(토코페롤아세테이트 6mg, 이.피.엘 리퀴덤엔에이 600mg, 티아민질산염 6mg, 리보플라빈 6mg, 피리독신염산염 6mg, 니코틴산아미드 30mg, 시아노코발라민 0.006mg)

성상 이 약은 황색의 내용물이 들어있는 적갈색의 장방형 연질 캡슐이다.

효능 및 효과 다음 질환의 보조 치료 : 급·만성 간질환, 담석 재발의 방지, 전자간증/자간증 관련 간질환

용법 및 용량 성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회 식간 복용한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 복용시 다음 사항에 주의할 것.
 - 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
 - 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시킬 것.
2. 복용 중 또는 복용후는 다음 사항에 주의할 것.
 - 1) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
3. 보관 및 취급상의 주의
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 (습기가 적고) 서늘한 곳에 (밀전하여) 보관할 것.
 - 3) 오염을 피하고, 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

저장방법 및 사용기간 기밀용기, 습기를 피하여 25°C이하에서 저장

제조일로부터 36개월

※ 판매원 제품문의처 : 02-2242-0232

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)의 정보마당을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 설명서 최종 개정연월일 : 2014.02.03

판 매 원 : (주)씨엘피앤디
서울 동대문구 장안동 377-3

제조외의사 : 정우신약(주)
충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

제 조 원 : 동방FTL(주)
경기도 화성시 향남읍 상신리 904-5